

Royaume de Belgique

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2, 7, §1^{er}, modifié par la loi du 22 mars 1989, 10, modifié par les lois du 9 février 1994 et 10 avril 2014, 18, §1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, et 20, §1^{er};

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 26 mars 2021;

Koninkrijk België

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN
DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, de artikelen 2, 7, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989, 10, gewijzigd bij de wetten van 9 februari 1994 en 10 april 2014, 18, §1, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en 20, §1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 26 maart 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 25 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° du Conseil d'État, donné le , en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Article 1^{er}. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° *Plantes*: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons;

2° *Plantes dangereuses*: plantes impropres à la consommation humaine;

3° *Préparation de plantes*: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs;

4° *Forme prédosée*: les formes suivantes: les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

5° *Arômes*: les substances définies à l'article 1^{er}, § 1^{er}, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 25 maart 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en van de Minister van Landbouw, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN
WIJ:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2002/46/EG van 10 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen.

Art 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° *Planten*: levende organismen, die in staat zijn uit anorganische grondstoffen door fotosynthese organische stoffen op te bouwen, de parasitaire planten en de paddenstoelen;

2° *Gevaarlijke planten*: planten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

3° *Plantenbereiding*: het resultaat van iedere behandeling die de plant of het plantendeel wijzigt om voor voedingsdoeleinden te dienen, met uitzondering van toevoegsels;

4° *Voorgedoseerde vorm*: de volgende vormen: capsules, pastilles, tabletten, pillen, comprimés, dragees, gelulen, granulen, ouwels en soortgelijke vormen, poederzakjes, drinkbare ampullen, druppelteller flesjes en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden;

5° *Aroma's*: de stoffen gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 24 januari 1990

arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;

6° *Ministre*: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

7° *Service*: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;

8° *Compléments alimentaires*: les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;

9° *substances des plantes*: substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes.

Art. 3. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté.

§ 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionnées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires.

Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.

Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;

Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1^{er} lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage.

Art. 4. § 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires:

a) des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen;

6° *Minister*: de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;

7° *Dienst*: het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu;

8° *Voedingssupplementen*: als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron vormen van één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect;

9° *plantenstoffen*: actieve stoffen van planten, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten, of merkers van planten.

Art. 3. § 1. Het is verboden planten, die vermeld zijn in lijst 1 van gevaarlijke planten in bijlage bij dit besluit, in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.

§ 2. Het is verboden plantenbereidingen, verkregen uit planten die vermeld zijn in lijst 1 van de bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.

Deze bepaling is niet van toepassing voor de fabricage van aroma's.

De Minister kan een lijst van planten vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's mogen gebruikt worden;

De Minister of zijn afgevaardigde kan afwijkingen toestaan op het verbod bedoeld in het eerste lid wanneer aan de hand van een toxicologisch en analytisch dossier kan worden aangetoond dat de plantenbereidingen de toxische eigenschappen of stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen bekomen zijn, niet meer bevatten; hij stelt de voorwaarden van deze individuele afwijkingen vast op basis van het advies van de Commissie van advies voor plantenbereidingen; deze voorwaarden hebben betrekking op de samenstelling van de producten en de vermeldingen die aangebracht moeten worden op hun etikettering.

Art. 4. § 1. Het is verboden als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen te fabriceren en in de handel te brengen:

a) paddenstoelen die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddenstoelen in bijlage bij dit besluit;

b) des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

c) des champignons séchés:

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier;

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;

d) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d'espèces différentes mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté;

e) des champignons, autres que frais, fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée;

f) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté qui sont fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée, à l'exception des truffes et des morilles;

g) des champignons contenant des insectes, des parties d'insectes ou des débris d'insectes;

h) des champignons qui ne sont pas frais de telle manière qu'ils peuvent présenter un danger pour la santé.

§ 2. Le Ministre peut fixer une liste de champignons qui peuvent être utilisés ou non pour la fabrication d'arômes ou d'additifs.

Art. 5. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément aux dispositions suivantes.

Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire ou via l'application FOODSUP sur le site internet du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes :

1° la nature du produit;

2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);

3° l'analyse nutritionnelle du produit, si d'application, et des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité et par portion journalière, la toxicité et la stabilité;

b) voedingsmiddelen, die paddenstoelen bevatten, die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddenstoelen in bijlage bij dit besluit;

c) gedroogde paddenstoelen:

– andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 en 2 in bijlage bij dit besluit, indien ze geheel zijn;

– andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit, indien ze in stukken zijn;

d) verschillende soorten paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit die gemengd zijn met elkaar of met paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit;

e) andere paddenstoelen dan verse, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te herkennen is;

f) paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te herkennen is, met uitzondering van truffels en morieljes;

g) paddenstoelen die insecten, insectendelen of insectenafval bevatten;

h) paddenstoelen die niet zodanig vers zijn dat ze een gevaar voor de gezondheid kunnen uitmaken.

§ 2. De Minister kan een lijst van paddenstoelen vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's of toevoegsels mogen gebruikt worden.

Art. 5. § 1. Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen samengesteld uit of bevattende één of meer planten die vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit en waarbij voldaan werd aan de beperkingen en voorwaarden, indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd overeenkomstig de volgende bepalingen.

Een notificatiedossier moet in één exemplaar of via de toepassing FOODSUP op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.gezondheid.belgie.be) ingediend worden. In het notificatiedossier zijn ten minste de volgende gegevens vermeld:

1° de aard van het product;

2° de ingrediëntenlijst van het product (kwalitatief en kwantitatief);

3° de nutritionele analyse van het product en, indien van toepassing, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van bekende significante werkzame stoffen of "merkers", indien bekend, per

4° l'étiquetage du produit;

5° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du Service;

6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 10, § 1^{er}, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui:

1° ne sont pas reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté ou;

2° sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1^{er} du présent article.

Le dossier de notification doit contenir les données du § 1^{er}, 2^e alinéa ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à la toxicité et aux quantités des substances actives les plus importantes, dans la mesure où elles sont connues et détectables.

§ 3. Dans le mois de la réception du dossier de notification visé aux paragraphes 1^{er} et 2, le Service envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un numéro de notification. Ce numéro de notification doit être repris dans tout document commercial.

Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements.

§ 4. Sans préjudice de la législation sur les médicaments, le Ministre peut, en ce qui concerne les plantes dans la liste 3 de l'annexe, déterminer des teneurs minimales et maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce de ces plantes.

Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1^{er} à 3 ne sont pas d'application:

doseereenheid en per dag, over de toxiciteit en over de stabiliteit;

4° de etikettering van het product;

5° de verbintenis geregeld en op wisselende tijdstippen ontledingen van het product uit te voeren en de resultaten ter beschikking van de Dienst te houden;

6° het bewijs van betaling van een retributie per genotificeerd product op de rekening van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten overeenkomstig artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

§ 2. Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen samengesteld uit of bevattende één of meer planten die:

1° niet vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit of;

2° vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit maar waarbij niet voldaan werd aan de beperkingen en voorwaarden, indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd, zoals bepaald in § 1 van dit artikel. Het notificatiedossier moet de gegevens van § 1, 2^{de} lid bevatten en bovendien alle nodige gegevens over de aard, de toxiciteit en de hoeveelheid van de belangrijkste werkzame stoffen, voor zover bekend en aantoonbaar.

§ 3. Binnen de maand na ontvangst van het in de paragrafen 1 en 2 bedoelde notificatiedossier stuurt de Dienst een ontvangstmelding aan de indiener ervan. De ontvangstmelding bevat een notificatienummer. Dit notificatienummer moet in alle handelsdocumenten vermeld worden.

In de ontvangstmelding kan de Dienst opmerkingen en aanbevelingen geven, onder meer voor het aanpassen van de etikettering, met name door het opleggen van de vermelding van waarschuwingen.

§ 4. Onverminderd de toepassing van de wetgeving op de geneesmiddelen, kan de Minister, met betrekking tot de planten in lijst 3 van de bijlage, voor de fabricage en het in de handel brengen van die planten minimale en maximale gehalten aan actieve stoffen en merkers vaststellen.

De desbetreffende besluiten worden genomen op advies van de Commissie van advies voor plantenbereidingen.

1° aux épices mentionnées dans l'arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d'épices;

2° à d'autres herbes aromatisantes qui sont apparemment destinées à être utilisées pour être ajoutées aux denrées alimentaires;

3° aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont mentionnées dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;

4° au thé (*Camellia sinensis*), au café (espèces du genre *Coffea*) et aux tisanes en sachets.

§ 6. Le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 4, 2^{ème} alinéa:

1° interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;

2° réserver le commerce en certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés;

3° modifier les listes en annexe du présent arrêté;

4° en ce qui concerne les plantes dans la liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, établir des substances caractéristiques de la plante ou des catégories caractéristiques des substances de la plante.

Art. 6. § 1^{er}. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes doit comporter les mentions suivantes:

1° la dénomination: «complément alimentaire»;

2° la portion recommandée à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;

3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;

4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;

§ 5. De bepalingen van de paragrafen 1 tot 3 zijn niet van toepassing:

1° op de specerijen die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende specerijen en specerijproducten;

2° op andere keukenkruiden die klaarblijkelijk bestemd zijn om als toekruiden aan de voedingsmiddelen te worden toegevoegd;

3° op plantenbereidingen in geconcentreerde of gedehydrateerde vorm die dienen voor de bereiding van limonades, vruchtensappen en groentesappen en waarvan de soorten vermeld zijn in het artikel 7, § 2 van koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en bepaalde soortgelijke producten;

4° op thee (*Camellia sinensis*), op koffie (soorten van het geslacht *Coffea*) en op tisanes in zakjes.

§ 6. De Minister kan, na advies van de in § 4, 2^{de} lid bedoelde Commissie:

1° verbieden dat bepaalde planten of plantenbereidingen met elkaar worden gemengd;

2° de handel in bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan vereisten inzake het bezit van een bepaald diploma of getuigschrift voorbehouden;

3° de lijsten in bijlage bij dit besluit wijzigen;

4° met betrekking tot de planten in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit, karakteristieke plantenstoffen of karakteristieke categorieën van plantenstoffen vastleggen.

Art. 6. § 1 Onverminderd de algemene en bijzondere bepalingen inzake etikettering en reclame voor voedingsmiddelen moet de etikettering van voedingssupplementen die planten en/of plantenbereidingen bevatten de volgende vermeldingen bevatten:

1° de benaming: «voedingssupplement»;

2° de aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie.

Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen portie te spreiden over verschillende dagen.

Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is;

3° een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijkse in te nemen portie;

4° een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard;

5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;

6° outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique;

7° le nom des substances de plantes ou le nom des catégories de substances de plantes qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes;

8° la teneur en substances ou en catégorie de substances présentes des plantes, reprises en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce sous forme non préemballée des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes.

§ 3. Les mentions, visés au § 1^{er}, 8° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.

Art. 7 Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit:

1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;

2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 8. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en application du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la présence de certaines plantes dans les denrées alimentaires.

Les plantes, mentionnées ou non dans les listes de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du

5° een vermelding dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt;

6° naast de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, ook de wetenschappelijke naam;

7° de naam van de plantenstoffen of de naam van de categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit zijn aangegeven, of informatie betreffende aard van deze plantenstoffen;

8° het gehalte van de aanwezige plantenstoffen of van een categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven, per in de etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie.

§ 2. Het is verboden voedingssupplementen die planten en/of plantenbereidingen bevatten onder niet-voorverpakte vorm in de handel te brengen.

§ 3. De in § 1, 8° bedoelde vermeldingen moeten gemiddelden zijn op basis van de analyse van het product.

Art. 7. In de etikettering en de presentatie en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;

2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

Art. 8. De voedingsmiddelen die niet aan de bepalingen van dit besluit of aan de door de Minister bij toepassing van dit besluit vastgestelde bepalingen voldoen zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 9. De bepalingen van dit besluit laten de toepassing van andere reglementaire bepalingen betreffende de aanwezigheid van bepaalde planten in voedingsmiddelen onverlet.

Planten, die al dan niet in de lijsten van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, vallen onder de toepassing van

règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission.

Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

Art. 11. L'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est abrogé.

verordening (EU) nr. 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie.

Art. 10. Inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, en gestraft overeenkomstig de voornoemde wet van 24 januari 1977.

Art. 11. Het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt opgeheven.

Art. 12. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


, le

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

Van Koningswege:

De Minister van Volksgezondheid,



Frank VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,

De Minister van Landbouw,

David CLARINVAL

ANNEXE à l'arrêté royal du ...
relatif à la fabrication et au
commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes
ou préparations de plantes

Liste 1: Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou
dans les denrées alimentaires

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van ...
de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit
plantenbereidingen samen gesteld zijn of deze bevatten

List 1 : Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen
gebruikt worden

Wetenschappelijke naam / Nom scientifique	Familie / Famille	Synoniemen / Synonymes	Nederlandse naam / nom Néerlandais	Fransc naam / nom Français	Bependingen en afwijkingsvoorwaarden	Limites et conditions de dérogation
Abrus precatorius L.	Leguminosae		weesboonnye	réglisse d'amérique		
Aconium spp.	Ranunculaceae		monnikskap	aconit		
Actaea spicata L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	actée en épi		
Adenium spp.	Apocynaceae					
Adonis spp.	Ranunculaceae		woorjaarsadonis	adonis du printemps		
Aethusa cynapium L.	Apiaceae		hondspeterselle	petite ciguë		
Agapanthus spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	agapanthe		
Agrostemma githago L.	Caryophyllaceae		bolderik	nielle des blés		
Aletris fatioma L.	Nartheciaceae					
Aleurites spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulier		
Aleurites moluccana (L.) Willd.	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	graine de jumbang, kukui, kemiri	Enkel niet-geraffineerde olie is toegelaten indien door ontledingssverslagen demonstree par des rapport d'analyse que cette huile ne contient pas d'esters de phorbol et deacetoartinezuur lager is dan 1%	Seule l'huile non raffinée est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'esters de phorbol et deacetoartinezuur lager is que la teneur en acide éléostéartique est inférieure à 1%.
Alkanna spp.	Boraginaceae		alkanna	porcanette		
Amaryllis spp.	Amaryllidaceae		amaryllis	amaryllis		
Amni majus L.	Apiaceae		groot akkerscheren	grand ammi		

Anacyclus officinarum	Anacyclus		duitse bertram	pyréthre d'Allemagne	
Anacyclus pyrethrum (L.)	Anacyclus		roomse bertram	pyréthre d'Afrique	
Anadenanthera spp.	Leguminosae				
Anagallis arvensis L.	Primulaceae		guichelheil	mouyon rouge des champs	
Anamirta cocculus (L.)	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik	coque du levant	
Anchusa spp.	Boraginaceae		ossentong	bugflosse	
Andromeda spp.	Ericaceae		lavendelhei	andromède	
Anemone spp.	Ranunculaceae		anemoon	anémone	
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock) Engl.		Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Ellas	angusturaboom	angusture vraie	
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coult.	Cactaceae	Anhalonium lewinii Heming	peyote, peyotl	peyote, peyotl	
Annona spp.	Annonaceae		o.a. zuurzakboom	e.a. corossol, cœur de bœuf	
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae		upas	ipo	
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae		wilde aklei	ancolie vulgaire	
Areca catechu L.	Arecaeae		areka, betelnootpaln	aréquier	
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	struikmargeriet	anthémis	
Arisaema spp.	Araceae		o.a. drakerap	e.a. navel indien	
Aristolochia spp.	Aristolochiaceae		pipbloem	aristolochie commune	
Arnica chamissonis Less.	Compositae		valkruid	arnica	
Arnica montana L.	Compositae		valkruid	arnica	
Artemisia annua L.	Compositae		zomeralsem	armoise annuelle	
Arum maculatum L.	Araceae		gevekte aronskelk	arum tacheté, gouet tacheté	
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae		Canadese mansoor	asaret du Canada	

Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae	mansoor	asarot d'Europe		
Aspidosperma spp.	Apocynaceae				
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Athyriaceae	wijfjesvaren	fougère femelle		
Atractylis gummifera (L.) Less.	Compositae		chardon à glu		
Atropa spp.	Solanaceae				
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae	broodboom	aucuba		
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve Vahl			
Baccharis spp.	Compositae				
Baptisia spp.	Leguminosae	o.a. wilde indigo	e.a. indigo sauvage		
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mab.	Iridaceae	Belamcanda chinensis (L.) DC.	luipaardbloem	fleur léopard	
Borago spp.	Boraginaceae	incl. bernagie	incl. bourrache		Seule l'utilisation des volgende plantendelen is parties suivantes de la plante est autorisée: graine, fleur.
Brachyglottis spp.	Compositae				De bereidingen zijn enkel toegelaten in voedingsmiddelen indien door ontleedingsverslagen denctes alimentaires kan aangeetoond worden dat die bereidingen maximaal 4 µg/kg toxische pyrrrolizidine alkaloiden bevatten.
Brayera anthelmintica Kunth	Rosaceae	Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.	kosoboom	koussou	pyrrrolizidine toxiques de ces préparations ne dépassent pas 4 µg/kg.
Brugmansia spp.	Solanaceae				
Brunfelsia spp.	Solanaceae				
Bryonia spp.	Cucurbitaceae	o.a. heggerank	bryone		

Buxus sempervirens L.	Buxaceae	palmboompe	buis commun		
Caladium spp.	Araceae		pédiveau		
Calca zacatechichi Schtidl	Compositae	droomkruid	l'herbe rêveuse		
Calla palustris L.	Araceae	slangewortel	calla des marais		
Caltha palustris L.	Ranunculaceae	dotterbloem	souci d'eau, populage des marais		
Canarium indicum L.	Burseraceae	nangainoten	noix de nagalle		
Cannabis sativa L.	Cannabaceae	hennep	chanvre		
Caragana arborescens Lam.	Leguminosae	ervensruik	arbre aux pois		
Carlina spp.	Compositae				
Caryota spp.	Araceae		ca. palmier céleri		
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae	gat	khath		
Catharanthus roseus (L.) G. Don.	Apocynaceae	roze maagdenpalm	pervenche de Madagascar		
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.	Berberidaceae	blauwe zilverkaars	bleu cohosh		
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson	Rubiaceae	Cephaelis acuminata Karst., Uragoga granatensis Baill.	racine d'ipéca, ipéca du Brésil		
		Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac			
Eysimum x cheiri (L.) Crantz	Brassicaceae	Cheiranthus x cheiri L.	gironnée des murailles, vélard		
Cestrum spp.	Solanaceae				
Ceterrach officinarum DC.	Aspleniaceae				

Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité

Ben afwiking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare

						hoeveelheid ptaquioside detectable de
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray	Melanthiaceae	helonias	fausse unicomne			beval.
Dysphania ambrosioides (L.) Mosykin & Clematis	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	wetiekende ganzevoot chénopode fausse- ambroise, thè-du- mexique			
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae					Une détrogation peut être Een afwijking kan worden toegerekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquioside bevat.
Cicuta virosa L.	Apiaceae		waterscheerling	cigüe viruse, cigüe aquatique		
Cineraria spp.	Compositae			cinétraire		
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	Cucumis colocynthis L.	kolokwint	coloquinte officinale		
Clivia miniata (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae	clivia, sint-jozebsbloem Heur- lis de saint joseph				
Clusia rosea Jacq.	Clusiaceae					
Cnidioscolus spp.	Euphorbiaceae					
Colchicum autumnale L.	Colchicaceae	herfsttijloos		colchique d'automne		
Colutea arborescens L.	Leguminosae	europese blazensruik		commun, arbre à vessies		
Comandra spp.	Santalaceae					
Conium maculatum L.	Apiaceae	gevekte scheerling	grande cigüe			
Convallaria majalis L.	Asparagaceae	lilleje-van-dalen, muguet				
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae	akkerwinde	liseron des champs			
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae	purgeerwinde	scammonée			
Cortaria myrsifolia L.	Cortariaceae	booiersruik	redoul			

Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl.	Coriariaceae					
Corydalis spp.	Papaveraceae		helmbloem, o.a. holwortel	e.a. corydale creuse		
Corydalis solida (L.) Clairv.	Papaveraceae	Corydalis bulbosa (L.) DC.	vingerhelmbloem	corydale solide, corydale à tubercule plein	Enkel het decoct van de wortelstok is toegelaten in voedingsmiddelen.	Seule la décoction du rhizome est autorisée dans les denrées alimentaires.
Corynanthe spp.	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Cotinus coggygria Scop.	Anacardiaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Cotoneaster spp.	Rosaceae		dwergmispel	cotonéaster		
Crinum asiaticum L.	Amaryllidaceae		lelie	crinum d'asie		
Crotalaria spp.	Leguminosae					
Croton spp.	Euphorbiaceae					
Cryptostegia spp.	Apocynaceae					
Cycas spp.	Cycadaceae		cycaspalm, varenpalm	cycas		
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Poaceae		handjesgras	chiendent dactyle		
Cynoglossum spp.	Boraginaceae		hondstong	cynoglosse		
Cypripedium calceolus L.	Orchidaceae		vrouwenschoentje	sabot de vénus		
Cytisus spp.	Leguminosae					
Dalechampia scandens Jacq.	Euphorbiaceae			liane ortie		
Daphne spp.	Thymelaeaceae					
Datura spp.	Solanaceae					
Delphinium spp.	Ranunculaceae		ridderspoor	staphisaigre, dauphinelle		
Derris spp.	Leguminosae					

Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara		Dicentra spectabilis (L.) Lem.	gebroken hartje	ccur de marie, ccur de jeannette	
Dichondra repens J.R. Forst. et G. Forst.	Convolvulaceae			dichondra rampant	
Dicamnus albus L.	Rutaceae		vuutwerplant, essenkruid	dicame blanc, fraxinelle	
Dieffenbachia spp.	Araceae		dieffenbachia	dieffenbachia	
Digitalis spp.	Plantaginaceae		vingerhoedskruid	digitale	
Tamus communis L.	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel	tamier commun	
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae		tonkabonen boom	fève de tonka	
Dicra palustris L.	Thymelaeaceae			dirca des marais	
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae		mannetjesvaren	fougère mâle	
Duboisia spp.	Solanaceae				
Durio zibethinus L.	Malvaceae		doetian	durian, durian	
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae		springkomekomeer	concombre d'âne, momordique	
Echinum spp.	Boraginaceae		o.a. slangekruid	e.a.vipérine	
Ephedra spp.	Ephedraceae		o.a. zeedruid	ephedra	
Erantia hyemalis (L.) Salisb.	Ranunculaceae		winterakoniet	erantia d'hiver, hellebore d'hiver	
Erechtites spp.	Compositae				
Erythrina spp.	Brassicaceae		erythrina	erythrine	
Erythroxylum coca Lam.	Leguminosae		cocastruik	coca	
Euphorbia spp.	Euphorbiaceae				
Euonymus europaeus L.	Celastraceae		wilde kardinaalsmuts	fusain d'europe	
Euphorbia spp.	Euphorbiaceae				
Euodia ruticarpa (A. Juss.) Benth., Evodia ruticarpa (A. Juss.)	Rutaceae				

		Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth				
<i>Excoecaria agallocha</i> L.	Euphorbiaceae					
<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ranunculaceae	<i>Ficaria renunculoïdes</i> Monch.	speenkruid	renoncule ficaire, ficaire fausse- renoncule		
<i>Forestiera</i> spp.	Oleaceae					
<i>Fritillaria imperialis</i> L.	Liliaceae		keizerskroon	fritillaire impériale, couronne impériale		
<i>Galanthus</i> spp.	Amaryllidaceae		o.a. sneeuwklokje	e.a. perce-neige		
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae		galega	galéga, sainfoin d'Espagne	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan galegine en peganine bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en galéguine et péganine est déterminée.
<i>Garcinia hanburyi</i> Hook. f.	Clusiaceae					
<i>Geissospermum</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Gelsemium</i> spp.	Gelsemiaceae			jasmin jaune		
<i>Genista tinctoria</i> L.	Leguminosae		verfbrem	genêt des teinturiers		
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae		hondsdrif	lierre terrestre		
<i>Globularia alypum</i> L.	Plantaginaceae		drietandkogelbloem	globulaire turbitt		
<i>Globularia vulgaris</i> L.	Plantaginaceae		gewone kogelbloem	globulaire commune		
<i>Gloriosa superba</i> L.	Colchicaceae		prachtlelie			
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Plantaginaceae		genadekruid	gratiolle		
<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Leguminosae	<i>Bandeiraea</i> <i>simplicifolia</i> (DC.) Benth.	griffonia	griffonia		
<i>Harungana</i> <i>madagascariensis</i> Lam. ex Poir.	Hypericaceae	<i>Harunga</i> <i>madagascariensis</i> L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	guttier du gabon		
<i>Heimia</i> spp.	Lythraceae					
<i>Heliotropium</i> spp.	Boraginaceae		heliotroop, zonnewende	héliotrope		

Helleborus spp.	Ranunculaceae	mieskruid, o.a. hellebore, e.a. rose de kerstroos	noël		
Hepatica nobilis Mill.	Ranunculaceae	leverbloempje	anémone hépatique		
Hieracium mantegazzianum Somnier et Levier	Apiaceae		reuzenberenklauw	berce de caucase	
Hippomane mancinella	Euphorbiaceae		manchineel	mancenillier	
Homalomena spp.	Araceae				
Hura crepitans L.	Euphorbiaceae		zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc	
Hyacinthus orientalis L.	Asparagaceae		hyacinth	hyacinthe d'orient	
Hyoscyamus spp.	Solanaceae				
Ilex aquifolium L.	Aquifoliaceae		hulst	houx	
Illicium anisatum L.	Schisandraceae	Illicium religiosum Siebold et Zucc.	japanse steranis	anis étoilé du japon	
Ipomoea spp.	Convolvulaceae		pronkwinde	ipomée	
Iris spp.	Iridaceae		o.a. lis	iris	
Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae		purgeernoot	médiciner, pourghère	
Juglans nigra L.	Juglandaceae		zwarte walnoot	moyer noir	
Juniperus sabina L.	Cupressaceae		sabijnse jeneverbes	genévrier sabine	
Kalmia latifolia L.	Ericaceae		lepelboom	laurier de montagne	
Laburnum anagyroides	Leguminosae	Cytisus laburnum L.	gewone goudenregen	cytise faux ébénier	
Medik.					
Lactuca virosa L.	Compositae		grijsla	lactue vireuse	
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosoostruik	crésofier	
Leopoldia comosa (L.) Parl.	Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	kuiltuyacint	muscari à toupet	
Leucojum vernum L.	Amaryllidaceae		lenteklokje	nivéole de printemps	
Ligustrum vulgare L.	Oleaceae		wilde liguster	troène commun	
Linaria vulgaris Mill.	Plantaginaceae		vlasbekje	linaire commune	En afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is.
					Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.

<i>Liriope</i> spp.	Asparagaceae					
<i>Lithospermum</i> spp.	Boraginaceae		o.a. parelzaad	e.a. grémil		
<i>Lobelia inflata</i> L.	Campanulaceae		gezwollen lobelia	lobélie enflée		
<i>Lonchocarpus</i> spp.	Leguminosae					
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliaceae		tuinkamperfoelie	chèvrefeuille des jardins		
<i>Lupinus</i> spp.	Cactaceae		lupine	lupin	De planten <i>Lupinus angustifolius</i> L. en <i>Lupinus albus</i> L. zijn toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloiden en geen anagyrine bevat.	Les plantes <i>Lupinus angustifolius</i> L. et <i>Lupinus albus</i> L. sont autorisées dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que la graine et la farine de ces plantes ne contiennent pas plus de 200 mg/kg d'alkaloïdes totaux et ne contiennent pas d'anagyrine.
<i>Lycoris</i> spp.	Amaryllidaceae					
<i>Lyonia</i> spp.	Ericaceae					
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae		dalkruid	maianthème à deux feuilles		
<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae		kamalaboom	kamala, rottlière des teinturiers		
<i>Mandragora officinarum</i> L.	Solanaceae		alruin	mandragore officinale		
<i>Meconopsis</i> spp.	Papaveraceae		schijnpapaver			
<i>Menispermum canadense</i> L.	Menispermaceae		Canadees Maanzaad.	Ménisperme du Canada		
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiaceae		tuinbingelkruid	mercuriale annuelle		
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Euphorbiaceae		bosbingelkruid	mercuriale vivace		
<i>Mesembryanthemum</i> spp.	Aizoaceae		o.a. middagbloem, ijskruid	e.a. ficoïde glaciale		
<i>Mimosa</i> spp.	Leguminosae			mimosa		

Mosannonna depressa (Baill.) Chatrou	Annonaceae	Guatteria gaumeri Greenm.	yumel	yumel		
Mucuna pruriens (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden harmaan alkaloiden, levo-dopa en lectine bevat. Een analyse van de niet proteinogene aminozuren moet uitgevoerd worden.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes harmanes, lévo-dopa et lectine. Une analyse des acides aminés non protéinogènes doit être effectuée.
Myoporum laetum G. Forst.	Scrophulariaceae		Ngaio boom	Arbre Ngaio		
Narcissus spp.	Amaryllidaceae		witte narcis, dichtersnarcis	narcisse des poètes		
Nerium spp.	Apocynaceae		oleander	laurier-rose		
Nicotiana spp.	Solanaceae		o.a. tabak	tabac		
Nigella damascena L.	Ranunculaceae		juffertje-in-'t-groen	nigelle de damas		
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae		witte waterlelie	nymphéa blanc		
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae		geurende waterlelie	nymphéa odorants		
Ochrosia spp.	Apocynaceae					
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae		addertong	ophioglosse commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture	Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae		vogelmelk	ornithogale		
Orobancha spp.	Orobanchaceae		bremraap	orobanche		
Oxalis spp.	Oxalidaceae		klaverzuring	oxalide, oxalis		
Paeonia spp.	Paeoniaceae		pioen	pivoine		
Papaver somniferum L.	Papaveraceae		slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal	Het zaad afkomstig van deze plant is toegelaten	La graine provenant de cette plante est autorisée

					als "maanzaad" op bakkerijproducten.	en tant que "graine de pavot" sur les produits de la boulangerie
Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae		eenbes	parisette		
Parthenocissus quinquefolia (L.)	Vitaceae		vijfbladige wingerd	vigne vierge		
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitrariaceae		harmala	harmal		
Petasites spp.	Compositae		hoefblad	pétasite		
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae					
Pfaffia spp.	Amaranthaceae					
Philodendron spp.	Araceae					
Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae		calabarbonen	fèves de calabar		
Phytolacca spp.	Phytolaccaceae		karmozijnbes	phytolaque		
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae			Piérís andromède		
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae			Andromède du Japon		
Pilocarpus spp.	Rutaceae					
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae		Driebladige pinellia	Pinellia	Afwijking kan toegestaan worden voor bereidingen van de gedroogde wortel.	Des dérogations peuvent être attribuées pour des préparations de la racine séchée.
Piper methysticum Forster f.	Piperaceae		kava, kava	kava, kava		
Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia	piscidie		
Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoet	podophyllée pelté		
Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	oranger trifolié		
Psoralea spp.	Rubiaceae					

<i>Psychotria viridis</i> Ruiz. et Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacrana	Sami Ruca		
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Olacaceae		adelaarsvaren	fougère-aigle		
<i>Ptychopetalum</i> spp.	Ericaceae					
<i>Pyrularia pubera</i> Michx.	Santalaceae		buffelnoot			
<i>Quassia</i> spp.	Simaroubaceae					
<i>Quillaja saponaria</i> Molina.	Quillajaceae		zeephoutboom	bois de panama, quillaia		
<i>Ranunculus</i> spp.	Ranunculaceae		boterbloem	renoncule		
<i>Rauvolfia</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Rhododendron</i> spp.	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
<i>Rhodomyrtus</i> spp.	Myrtaceae					
<i>Rhus</i> spp.	Anacardiaceae		sumak	sumac		
<i>Rhus aromatica</i> Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	rhus aromatique	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus glabra</i> L.	Anacardiaceae		gladde sumak	sumac à bois glabre	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhynchosia</i> spp.	Leguminosae					
<i>Richardia scabra</i> L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	faux ipéca		
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae		wonderboom	ricin commun		
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae					

Roemeria hybrida L. DC.	Papaveraceae					
Rubia tinctorum L.	Rubiaceae		meekrap	garance des teinturiers		
Ruta spp.	Rutaceae					
Salvia divinorum Epling & Játiva	Lamiaceae		centraal amerikaanse salie	sauge des aztèques		
Sanguinaria canadensis L.	Papaveraceae		bloedwortel	sanguinaire du canada		
Sansevieria spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	sansevière		
Santalum album L.	Santalaceae		sandelboom	Santal blanc, sandal		
Sassafras albidum (Nutt.) Nees	Lauraceae	Sassafras officinale T. Nees & C.H. Eberm.	sassafrashout	bois de sassafras		
Saussurea spp.	Compositae					
Schefflera spp.	Araliaceae					
Schinus molle L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	faux poivrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schinus terebinthifolius Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	baies roses, poivre rose	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A.Gray	Melanthiaceae	Sabadilla officinalis (Schltdl. & Cham.) Standl. Brandt. et Ratzeb.	sabadilkruid	cévadille		
Scindapsus spp.	Araceae					
Scopolia spp.	Solanaceae					
Scrophularia spp.	Scrophulariaceae		helmkruid	scrofulaire		
Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae		Baikalglidkruid	Scutellaire du lac Baïkal	Het gebruik van de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.

Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae				Het gebruik van de hele plant is toegelaten indien met analyse aangetoond werd dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoclerodanen bevat en door een botanisch certificaat werd aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'utilisation de la plante entière est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néoclerodanes et si par certificat botanique il a été démontré que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Scutellaria spp.	Lamiaceae		blauw glidkruid	scutellaire toque		
Securigera varia (L.) Lassen	Leguminosae	Coronilla varia L.	bont kroonkruid	coronille bigarrée		
Senecio spp.	Compositae		kruiskruid	séneçon		
Sesbania spp.	Leguminosae					
Sida cordifolia L.	Malvaceae		bala	bala		
Sida rhombifolia L.	Malvaceae					
Simarouba amara Aubl.	Simaroubaceae					
Solandra grandiflora Sw.	Solanaceae			liane trompette		
Solanum americanum Mill.	Solanaceae	Solanum nigrum L.	zwarte nachtschade	morelle noire		
Solanum dulcamara L.	Solanaceae		bitterzoet	douce-amère, morelle douce-amère		
Solenostemma argel (Delile) Hayne	Apocynaceae					
Sorbus domestica L.	Rosaceae		peervormigelijsterbes	cormier, sorbier domestique		
Spartium junceum L.	Leguminosae		spaanse brem	genêt d'Espagne		
Spathiphyllum spp.	Araceae					
Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae			spigélie vermifuge		
Spigelia marilandica (L.) L.	Loganiaceae					

Sprekella spp.	Amaryllidaceae	goudlelie	e.a. croix de saint-jaques	
Stephanotis spp.	Apocynaceae	bruidsbloem	jasmijn de madagascar	
Sterbergia spp.	Amaryllidaceae			
Strophanthus spp.	Apocynaceae			
Stychnos spp.	Loganiaceae			
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae	sneeuwbes	symphorine	
Symphytum spp.	Boraginaceae	smeervortel	consoude	
Tabebuia spp.	Bignoniaceae			
Tabernaemthe iboga Baill.	Apocynaceae	iboga	iboga	
Tanacetum cinerariifolium (Trevit.) Sch. Bip	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevit) Vis.	dalmatisch vlooienkruid pyréthre	
Taxus spp.	Taxaceae	taxus	if	
Tephrosia spp.	Leguminosae			
Tetradlepis articulata (Vahl.) Mast.	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis Vent. Callitris quadrivalvis Rich. & A.Rich.	sandararak, kamercipres sandaraque, thuja de Barbade	
Teucrium chamaedrys L.	Rutaceae	echte gamander	germandrée petit-chené	
Teucrium polium L.	Lamiaceae		germandrée tomentuse	
Thevetia spp.	Lamiaceae	o.a. gele oleander	e.a. laurier-rose jaune	
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae	westerse levensboom	thuya d' occident	
Trichocereus spp.	Cactaceae			
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae			
Trolius europaeus L.	Ranunculaceae	europese trolius	troile d' europe	
Tulipa spp.	Liliaceae	tulp	tulipe	
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae			
Tussilago spp.	Compositae	klein hoefblad	tussilage	

Tylophora asthmatica Wight et Arn.	Apocynaceae			asmaica, faux-ipec		
Urginea spp.	Asparagaceae		zeeajuin	scille maritime		
Veratrum spp.	Melanthiaceae		nieswortel	vératre		
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal	viorne à feuilles de prunier		
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	dompte-venin		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauwereggen	glycine du japon		
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauwereggen	glycine de chine		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	uzara		
Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum armatum DC.	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout	zanthoxylle	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae		alkaligras	cannash		

Liste 2: Champignons comestibles

Lijst 2: Eetbare paddenstoelen

Partie 1: Champignons comestibles cultivés

Deel 1: Gekweekte eetbare paddenstoelen

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Franse naam		
Agaricus arvensis Sch.: Fr.	Agaricaceae		Anijschampignon	Agaric des jachères		
Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Albidus (Lange) Sing.	Agaricaceae		Gekweekte champignon	Agaric bispore, Champignon de Paris, variété blanche		
Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Avellanuss Lange) Sing.	Agaricaceae		Kastanjechampignon	Agaric bispore, Champignon de (Paris, variété blonde)		
Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliotte des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric des jachères		
Agaricus silvicola (Vitt.) Peck	Agaricaceae		Slanke anijschampignon	Agaric sylvicole		
Agaricus subrufescens Peck	Agaricaceae	Agaricus blazei Murill	Amandelpaddenstoel	Agaric auguste		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du Peuplier, Pivoulade		
Boletus aereus Bull. ex Fr.	Boletaceae		Bronskleurig eekhoorntjesbrood	Cèpe bronzé, Tête- de-nègre		
Boletus reticulatus Schaeff.	Boletaceae	Boletus aestivalis (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoorntjesbrood	Cèpe d'été		
Boletus rex-veris D. Arora & Simonini	Boletaceae			Cèpe Roi du printemps		
Coprinus comatus (Müll.:Fr.) Pers.	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		

Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	Paecilomyces hepiali Q.T. Chen & R.Q. Dai Ophiocordyceps sinensis			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Seule l'utilisation dans les compléments alimentaires est autorisée.
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalaciaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		Gesteelde lakzwam	Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant		
Ganoderma tsugae Murr.	Ganodermataceae					
Grifola frondosa (Dicks.) Gray	Meripilaceae		Eikhaas	Poule de bois, Polypore en touffes		
Grifola umbellata (Pers.) Pilat	Meripilaceae		Schermpjesalkhaas			
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer	Strophariaceae		Dennezwavelkop	Hypholome doux		
Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.	Hericiaceae		Pruikzwam	Hydne hétisson		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing.	Lyophyllaceae		Buna Shimeji	Buna Shimeji		
Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Kühner	Lyophyllaceae		Iepenzwam	Lyophylle de l'Orme		
Lactiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill	Fomitopsidaceae		Zwavelzwam	Polypore souffré		
Lasiosphaeria gigantea Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae					
Lentinula edodes (Berk.) Pegler	Marasmiaceae		Shiitake	Shiitake		
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae		Paarse schijnridder	Pied bleu		
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser	Agaricaceae		Blanke Parasolzwam	Lépiote pudique		

Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae		Hon-Shimeji	Hon-Shimeji		
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune		
Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm. Smith & Singer	Strophariaceae		Kleine bundelzwam	Pholiote changeante		
Pholiota nameko (I. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae		Nameko	Naméko		
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
Pleurotus citrinopileatus Singer	Pleurotaceae		Goudkleurige oesterzwam	Pleurote jaune		
Pleurotus colombinus	Pleurotaceae					
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
Pleurotus cystidiosus O.K. Miller	Pleurotaceae					
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Kruisdisteloesterzwam	Pleurote du Panicaud		
Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae					
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae		Gewone oesterzwam	Pleurote en huitre		
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Bleke oesterzwam	Pleurote pulmonaire		
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer	Pleurotaceae					
Pleurotus salmoneostramineus Vassil	Pleurotaceae		Zalmoesterzwam	Pleurote saumon		
Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae		Floridazwam	Pleurote de Floride		
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Polyporaceae		Schermpjeseikhaas	Polypore en ombelle		
Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae		Blauwplaatstropharia	Strophaire à anneau rugueux		
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer	Pluteaceae		Rijststrozwam, Tropische beurszwam	Volvaire cultivée		

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine

De paddenstoelen vermeld in deel 2 van lijst 2 in de mate dat ze kunnen geteeld worden en voor menselijke consumptie geschikt blijven.

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Deel 2: Wilde paddenstoelen die mogen in de handel gebracht worden in zoverre de reglementering van bedreigde soorten dat toelaat

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Franse naam		
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Agaricaceae		Straatchampignon	Psallote des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric champêtre		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du jeuplier; Pivoulade		
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam	Pézize orangée		
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray	Amanitaceae		Parelamaniet	Amanite rougissante; Golmotte		
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l.	Physalacriaceae		Honingzwam s.l.	Armillaire couleur de miel s.l.		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Boletus badius non sensu Persoon	Boletaceae	Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert	Kastanjeboleet	Bolet bai		
Boletus edulis Bull.: Fr.	Boletaceae		Eekhoortjesbrood	Cèpe de Bordeaux		
Boletus erythropus Pers.	Boletaceae		Gewone heksenboleet	Bolet à pied rouge		
Bovista plumbea Pers.	Agaricaceae		Loodgrijze bovist	Boviste plombée	Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.	Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer	Lyophyllaceae		Voorjaarspronkridder	Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron		

Cantharellus cibarius Fr.: Fr.	Cantharellaceae	Hanekam; Doolerzwam; Cantharel	Chanterelle orangée		
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.	Cantharellaceae	Trechterscantharel	Chanterelle en tube		
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray	Agaricaceae	Gesclubde inktzwam	Coprin chevelu		
Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers.	Cantharellaceae	Hoorn-van-overvloed	Trompette de la mort		
Disclotis venosa (Pers.: Fr.) Fr.	Morchellaceae	Grote aderbekerzwam	Pézize veinée		
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalacriaceae	Fluweelpooftje	Collybie à pied velouté		
Hydnum repandum L.: Fr.	Hydnaceae	Gele steekelzwam	Pied de mouton		
Hygrophoropsis aurantiflora (Wulf.: Fr.) Maire	Hygrophoropsidaceae	Valse cantharel	Fausse girofle		
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Hydnangiaceae	Amethistzwam; Rode koelzwam	Laccaire améthyste		
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke	Hydnangiaceae	Fopzwam	Laccaire laqué		
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray	Russulaceae	Oranjegeroe mekzwam	Lactaire délicieux		
Langemannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.	Agaricaceae	Reuzenbovist	Vesse-de-loup géante		
Lepista inversa (Scop.) Pat.	Ticholomataceae	Roodbruine trechterzwam	Clitocybe inversé		
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke	Ticholomataceae	Paarse schijndderzwam	Pied bleu		
Leucagaricus leucothites (Vit.) Wässer	Agaricaceae	Lepiota naucina	Blanke parasolzwam		
Macrolepia procera (Scop.: Fr.) Singer	Agaricaceae	Grote parasolzwam	Coulemelle, Lépiole élevée		
Marasmius oreades (Balt.: Fr.) Fr.	Marasmiaceae	Weidekringzwam	Marasme des Oreades; Faux mousseron		
Morchella angusticeps Peck	Morchellaceae		Morille		
Morchella elata Fr.: Fr.	Morchellaceae	Kegelemorille	Morille conique		
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae	Gewone morille	Morille commune		

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer	Pleurotaceae		Gewone Oesterzwam	Pleurote en forme d'huître		
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Regenboogrussula	Russule charbonnière		
Russula vesca Fr.	Russulaceae		Smakelijke russula	Russule comestible		
Russula virescens (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Ruwe russula	Russule verdoyante; Palomet		
Suillus granulatus (L.) O. Kuntze	Suillaceae		Melkboleet	Bolet granulé		
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer	Suillaceae		Gele ringboleet	Bolet élégant		
Suillus luteus (L.: Fr.) S.F. Gray	Suillaceae		Bruine ringboleet	Bolet jaune		
Tremella fuciformis Berk.	Tremellaceae		Witte trilzwam	Trémelle blanche		
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken	Tricholomataceae		Matsu-take	Matsutake		
Tricholoma populinum	Tricholomataceae		Lange Populieridderzwam	Tricholome des peupliers		
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quélet	Tricholomataceae		Glanzende ridderzwam	Tricholome prétentieux		
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer	Tricholomataceae		Donkergrijze ridderzwam	Tricholome terreux; Petit-gris		
Tuber aestivum Vitt.	Tuberaceae		Zomertruffel	Truffe d'été		
Tuber magnatum Pico sp.	Tuberaceae		Witte truffel	Truffe blanche		
Tuber melanosporum Vitt.	Tuberaceae		Perigordtruffel	Truffe du Périgord		
Tuber indicum Cooke & Massee	Tuberaceae		Chinese of Aziatische truffel	Truffe chinoise ou asiatique		
Tuber uncinatum Chatin	Tuberaceae		Bourgognetruffel	Truffe de Bourgogne		
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae	Poria cocos Wolf		Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Seule l'utilisation du sclérote est autorisée.

Lijst 3: Planten à notifier si sous forme préclosée

Lijst 3: Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

Botanische naam / Nom botanique	Familie / Famille	Synoniem / Synonyme	Naam	Nom	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parties de plante autorisée ou préparation particulière	Voorwaarden	Conditions
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	okra, gombo, cabo, calou	vrucht	fruit		
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medlk.	Malvaceae		ambrettezaad, muskuszaad	ambrette	zaad	graine		
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine		
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	Pinaceae		balsemspar, canadabalsem	sapin baumier	schors, naald, hars, twijg	écorce, aiguille, résine, brindille		
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i> (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	<i>Abies pectinata</i> Dc. Var. <i>Equi-Trojani</i> Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée	schors, naald	écorce, aiguille		
<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae		siberische zilverden	sapin de sibérie	schors, tak, naald, hars	écorce, rameau, aiguille, résine		
<i>Abroma augusta</i> L. f	Malvaceae				wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter les avertissements

							waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Acacia catechu (L.f.) Willd.	Leguminosae			acacia à cachou, cachoutier	gom	gomme		
Acacia decurrens Willd.	Leguminosae				gom	gomme		
Acacia nilotica (L.) Delile	Leguminosae	Acacia arabica (Lam.) Willd.	echte acacia, gom-acacia	acacia du nil	schors, vrucht, gom	écorce, fruit, gomme		
Acacia senegal (L.) Willd.	Leguminosae		arabische gom	gommier blanc, acacia sénégal	schors, gom	écorce, gomme		
Acacia seyal Delile	Leguminosae				gom	gomme		
Acanthus mollis L.	Acanthaceae		stekelige berenklauw	acanthé molle, acanthé à feuilles larges	hele plant	plante entière		
Acer campestre L.	Sapindaceae		Spaanse aak, veldesdoorn	Érable champêtre	knop	bourgeon	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Acer negundo L.	Sapindaceae		vederesdoorn	érable negundo, érable négondo, érable à giguère,	schors	écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen	L'analyse doit démontrer que la préparation ne

				érable à feuilles de frêne, érable américain			detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Acer saccharinum L.	Sapindaceae		witte esdoorn of zilveresdoorn	érable argenté, érable de virginie, plaine blanche	bast, hout	liber, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Achillea ageratum L.	Compositae			achillée à feuilles d'agératum, achillée visqueuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea atrata L.	Compositae		dofzwart duizendblad	achillée noirâtre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erbarotta All.	Compositae			achillée à feuilles simples	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erbarotta subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson	Compositae		duizendblad, hemdsknoopjes, muskusduizendblad	achillée musquée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae	Diotis candidissima Desf., Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns & Link			bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea millefolium L.	Compositae		gewoon duizendblad	achillée millefeuille	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea nana L.	Compositae		wilde bertram	achillée naine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea ptarmica L.	Compositae		wilde bertram	achillée sternutatoire	bovengrondse delen	parties aériennes		

Achyranthes bidentata Blume	Amaranthaceae		dubbelgetande amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	racine		
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijnknoppenk ruid, braziliaanse cresson	cresson de para, brède mafané	bovengrondse delen	parties aériennes		
Acorus calamus L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	acore, acore odorant, acore vrai	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van beta-asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgewicht . De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae	Cimicifuga heracleifolia Kom.	zilverkaars		wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :

							bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoening en.	Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
<i>Actaea racemosa</i> L.	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	zwarte Amerikaanse slangenwortel	actée américaine, cimicaire	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoening en.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Actinidiaceae		kiwi, chinese kruisbes	kiwi, groseille de chine	vrucht, knop	fruit, bourgeon		
<i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.)	Actinidiaceae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bourgeon		

C.F.Liang & A.R.Ferguson								
Adansonia digitata L.	Malvaceae		baobab	baobab, pain de singe	vrucht	fruit		
Adiantum capillus-veneris L.	Pteridaceae		europes venushaar	capillaire, cheveux de vénus	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adiantum pedatum L.	Adiantaceae		hoefijzervaren	adiante du canada, capillaire du canada, adiante pédalée	hele plant gekookt of gedroogd	plante entière cuite ou séchée	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adoxa moschatellina L.	Adoxaceae		muskuskruid	petite musquée	hele plant	plante entière		

Aegopodium podagraria L.	Apiaceae		zevenblad	égopode podagraire, herbe aux goutteux, podagraire	blad	feuille		
Aesculus hippocastanum L.	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	marronnier commun, marronnier d'inde	zaad, bladknop	graine, bourgeon de feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	Amomum angustifolium Sonn.	madagascar cardamom	maniguette fine, cardamom de Madagascar	vrucht, zaad	fruit, graine		
Aframomum exscapum (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, graine		
Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boechoe	buchu	blad	feuille		
Agathosma crenulata (L.) Pillans	Rutaceae	Barosma crenulata (L.) Hook., Barosma serratifolia (Curtis) Willd.	eironde buchu		blad	feuille		

Agathosma serratifolia (Curtis) Spreeth	Rutaceae						blad	feuille	
Agave americana L.	Asparagaceae	honderdjarige aloë	agave américain, agave d'amérique	bloemstengel	dge florale				
Agave sisalana Perrine	Asparagaceae	sisal	sisal	bloemstengel,	dge florale,				
Agave tequilana F.A.C. Weber	Asparagaceae	blauwe agave	agave bleu	bloemstengel,	dge florale,				
Agatmonia eupatorioides L.	Rosaceae	gewone agatmonie	agatmonie	hele plant	plant				
Agatmonia repens L.	Rosaceae	Agatmonia odorata Mill.	weltrekkende agatmonie	bovengrondse delen	parties aériennes				
Agave chamaecypariss (L.) Schreb.	Lamiaceae	akkerzennegroen	bugle petit pin, bugle ou d'ivette	bovengrondse delen	parties aériennes				
Agave iwa (L.) Schreb.	Lamiaceae		ivette musquée, germandrée musquée, bugle fausse ivette	bovengrondse delen	parties aériennes				
Ajuga reptans L.	Lamiaceae	krupend	bugle rampante	bovengrondse delen	parties aériennes				
Albizia julibrissin Durazz.	Leguminosae	perzische slaaboom, zijdeboom	acacia de constantinople, arbre de soie	schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.		
Alcea rosea L.	Malvaceae	Althaea rosea (L.) Cav	stokroos	passerose, passe-rose, trémère	bloem	flor			
Alchemilla vulgaris L.	Rosaceae	Alchemilla xanthochloa Rothm.	spitslobbige vrouwenmantel	alchemille à lobes aigus	hele plant	plant			
Allisimata aquatica L.	Allisimataceae		grote waterweegbree	plantain d'eau commun	wortel	racine			

Alisma plantago-aquatica subsp. orientale (Sam.) Juz.	Alismataceae	Alisma orientale (Sam.) Juz.	waterweegbree	plantain d'eau	wortelstok, knol	rhizome, tubercule		
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	Sisymbrium alliaria (L.) Scop.	look-zonder-look	alliaire, herbe à ail	hele plant	plante entière		
Allium ampeloprasum L.	Amaryllidaceae	Allium porrum L.	oerprei	Poireau d'été	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium ascalonicum L.	Amaryllidaceae		sjalot	échalote, échalotte	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium cepa L.	Amaryllidaceae		ui	oignon	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae			knoflook		ail cultivé	bol	bulbe	gebruik van anticoagulantia. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	concomitant d'anticoagulants. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacies en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.		
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Amaryllidaceae			bieslook		ciboulette	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacies en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.		
<i>Allium ursinum</i> L.	Amaryllidaceae			daslook		ail des ours	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacies en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae			zwarte els		aulne noir, aulne glutineux, aulne commun	schors, bladknop, blad, gom	écorce, bourgeon de feuille,	gebruik van anticoagulantia.	concomitant d'anticoagulants.		

						feuille, gomme		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		grauwe els, witte els, grijze els	aulne blanc, aulne rugueux, aulne de montagne, arceve, varne	schors, bladknop	écorce, bourgeon de feuille		
<i>Aloe africana</i> Mill.	Xanthorrhoeac eae				blad, gel, latex (sap)	feuille, gel, latex (jus)	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloina) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloina) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe arborescens Mill.	Xanthorrhoeac eae		kandelaraloë	aloës arborescent	blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe ferox Mill.	Xanthorrhoeac eae		kaapse aloë	aloës	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe perryi Baker	Xanthorrhoeaceae				blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloine) supérieure à 14 mg. Les résultats

							moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeaceae		waaieraalwijn, waaieraloë	aloès éventail	blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

							volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeaceae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	aloès	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloysia citriodora Palau	Verbenaceae	Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	verveine odorante, verveine citronnée, citronelle verveine	blad	feuille		
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae		grote galgant	grand galanga	wortelstok	rhizome		
Alpinia hainanensis K.Schum.	Zingiberaceae	Alpinia katsumadae Hayata			hele plant	plante entière		
Alpinia officinarum Hance	Zingiberaceae		kleine galgant	petit galanga	wortelstok	rhizome		
Alpinia oxyphylla Miq.	Zingiberaceae				vrucht, wortelstok	fruit, rhizome		
Althaea officinalis L.	Malvaceae		echte heemst, witte malve, witte maluw	guimauve officinale, mauve blanche, bourbon de saint-jacques	hele plant	plante entière		
Amaranthus caudatus L.	Amaranthaceae		kattenstaartamara nt	amarante queue de renard, amarante caudée	blad, zaad	feuille, graine		
Amaranthus cruentus L.	Amaranthaceae		paarse amarant	amarante étalée, amarante couleur de sang, amarante rouge, amarante paniculée,	zaad	graine		

						amarante sanglante, épinard du soudan, queue de renard					
Amni visnaga Lam.	Apiaceae			fijn akkerscherm, khella		petit ammi, herbe aux cure-dents, khella	vrucht	fruit			
Amomum villosum var. xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberaceae	Amomum xanthioides Wall. ex Baker					zaad	graine			
Amorphophallus konjac K. Koch	Araceae			konjac		konjac	wortel	racine			
Amyris balsamifera L.	Rutaceae			amyris, sandelhout west, west-indisch rozenhout		amyris baumier, amyris, bois de rose, chandelle	hout, oliebars	bois, oléorésine			
Ananas comosus (L.) Merr.	Bromeliaceae			ananas		ananas	vrucht	fruit			
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees	Acanthaceae			justice, indiasc gentiaan		echinacée d'inde	blad	feuille			
Anemarrhena asphodeloides Bunge	Asparagaceae						wortelstok	rhizome			
Anethum graveolens L.	Apiaceae			dille		aneth, fenouil bâtard	vrucht	fruit			
Angelica archangelica L.	Apiaceae			grote engelwortel		angélique vraie	hele plant	plante entière			
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae			aziatische engelwortel, bai zhi		bai zhi	wortel	racine			

<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae		shishiudo, du huo	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Apiaceae		chinese engelwortel, dong quai	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae		gewone engelwortel	blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	<i>Cusparia officinalis</i> Engl.; <i>Cusparia trifoliata</i> (Willd.) Engl.		schors	écorce		
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae		zuurzak, guanábana	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acetogénines.
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae		custardappel, ossenhart	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acetogénines.
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae		zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acetogénines.

<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Leguminosae		wondklaver	vulnéraire	hele plant	plante entière		
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Plantaginaceae		grote leeuwenbek	grand muflier, muflier à grandes fleurs, gueule-de- loup, gueule-de- lion	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.	grote leeuwenklauw	alchemille des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Aphanizomenon flosaquae</i> Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA	algue blue-vert du lac klamath, AFA	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat. Het gehalte aan microcystine moet onder 1 µg/g zijn.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en toxines marines. La teneur en microcystine doit être inférieure à 1 µg/g.
<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae		selderij	céleri sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Leguminosae		aardnoot	arachide, cacahuète	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Araliaceae		japanse engelenboom	angélique en arbre du japon	blad, wortelschors	feuille, écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Aralia racemosa</i> L.	Araliaceae		troसारalia, amerikaanse nardus	aralia à grappes	wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter l'avertissement

Arbus unedo L.	Ericaceae			aardbeiboorn	arbousier commun	vrucht, blad	fruit, feuille	waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.	suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Arctium lappa L.	Compositae			amerikaanse nardus	grande bardane	hele plant	plante entière			
Arctium minus (Hill) Bernh.	Compositae	Lappa minor Hill		kleine klit	petite bardane	hele plant	plante entière			
Arctium tomentosum Mill.	Compositae			donzige klit	bardane tomenteuse, bardane poilue	hele plant	plante entière			
Argania spinosa (L.) Skeels	Sapotaceae			arganboom	arganier	vrucht, pitolie	fruit, huile de noyaux	Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als nodel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).	

<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae		mierikswortel, mierik	raifort, cranson	wortel	racine		
<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Compositae	<i>Artemisia procera</i> Willd.	citroenkruid	aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, arque busc.	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Compositae		absintalsem		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	Compositae		velriekende alsem	armoise capillaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Compositae		dragon	estragon	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

								supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia frigida</i> Willd.	Compositae		westerse bijvoet	armoise douce	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia genipi</i> Weber ex Stechm.	Compositae		alpenbijvoet	génépi vrai, génépi noir	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia glacialis</i> L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia judaica</i> L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia pontica L.	Compositae			kleine alsem, pontische alsem	petite absinthe, absinthe romaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia umbelliformis Lam.	Compositae			kleine alpenabsint	génépi blanc	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia vallesiaca All.	Compositae				arnoise du valais	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia verlotium Lamotte	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia vulgaris L.	Compositae			bijvoet	arnoise vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière

									recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
									hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van thujon hoger dan 6 mg.
									analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittetbehandeling ondergaan.
									L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité detectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae	broodboom	arbre à pain	vrucht, zaad, hout	fruit, graan, bois				
Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis	Fucaceae	knotswier	ascophylle nouseuse	thallus	thallus				
Asimina triloba (L.) Dunal	Annonaceae	pawpaw	asiminier	vrucht rijpe	fruit mûr				L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité detecteerbare hoeveelheden acétogénines bevat.
Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae	aspalathus, rooibos the	aspalathus, rooibos the	bovengrondse delen	parties aériennes				
Asparagus cochinchinensis (Tour.) Merr.	Asparagaceae	chinese asperge	asperge chinoise	wortel	racine				
Asparagus officinalis L.	Asparagaceae	asperge	asperge	wortel, scheut	racine, pousse				
Asparagus racemosus Willd.	Asparagaceae	satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome				

Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.			gom	gomme		
Astracantha cretica (Lam.) Podlech	Leguminosae	Astragalus creticus Lam.			gom	gomme		
Astracantha gummifera (Labill.) Podlech	Leguminosae	Astragalus gummifer Labill.			gom	gomme		
Astracantha microcephala (Willd.) Podlech	Leguminosae	Astragalus microcephalus Willd.			gom	gomme		
Astragalus membranaceus Moench	Leguminosae		astragalus	astragale	wortel	racine		
Astrantia major L.	Apiaceae		zeeuws knoopje, groot sterrenscherm	grande astrance, grande radiaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Athamanta macedonica (L.) Spreng.	Apiaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	Compositae					wortelstok	rhizome	gebruik van antiticoagulantia. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antiticoagulantia.	concomitant d'anticoagulants. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	Compositae					wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antiticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Avena fatua</i> L.	Poaceae				oot	folle-avoine, averon, coquiole, havenon	parties aériennes		
<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae				haver, gekweekte haver carqueja	avoine, avoine cultivée baccharis	parties aériennes plante entière		
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Compositae			Baccharis genistelloides var. trimera (Less.) Baker		hele plant		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

							gebruik van antidiabetische behandeling.	concomitant de traitement contre le diabète.
Bacopa monnieri (L.) Wettst.	Plantaginaceae	Bacopa monnieri (L.) Pennell	kleinbladige bacopa, brahmi	hysope d'eau, brahmi	hele plant	plante entière		
Bactris gasipaes Kunth	Arecaceae		perzikipalm	palmier pêche, péjibaie, parépou	vrucht	fruit		
Balanites aegyptiaca (L.) Delile	Zygophyllaceae			dattier du désert	hele plant	plante entière		
Ballota nigra L.	Lamiaceae		stinkende ballote	ballotte fétide, ballotte noire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	Lamiaceae		stinkende ballote	ballotte du midi, ballotte fétide	hele plant	plante entière		
Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	bamboe	bambou tabashir	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Bambusa vulgaris Schrad.	Poaceae		bamboe	bambou	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	cresson de terre, barbarée printanière	bovengrondse delen	parties aériennes		
Barbarea vulgaris R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	barbarée commune, herbe de sainte-barbe	bovengrondse delen	parties aériennes		
Bellis perennis L.	Compositae		madeliefje	pâquerette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Berberis aquifolium Pursh.	Berberidaceae	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	mahonia aquifolium (pursh) nutt.	mahonia	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

Berberis aristata DC.	Berberidaceae						wortel	racine	isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	ingestion d'alkaloides d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Berberis vulgaris L.	Berberidaceae				zuurbes	epine-vinette	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloides d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae				paranoot, brazilnoten, Amazonianoten	noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil	noot	noix	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	ingestion d'alkaloides d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Beta vulgaris L.	Amaranthaceae				gekweekte biet	betterave cultivée	hele plant	plante entière		

Betula alleghaniensis Britton	Betulaceae		gele berk	boulean jaune	schors, blad	écorce, feuille		
Betula lenta L.	Betulaceae		suikerberk	boulean flexible, boulean acajou, boulean merisier	schors, blad, sap	écorce, feuille, sève		
Betula pendula Roth	Betulaceae		ruwe berk	boulean verruqueux, boulean blanc	knop, schors, blad, teer, sap	bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève		
Betula pubescens Ehrh.	Betulaceae		zachte berk, gewone berk	boulean pubescent, boulean des marais	knop, schors, blad, sap	bourgeon, écorce, feuille, sève		
Bixa orellana L.	Bixaceae		orleaanboom	rocouyer	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine		
Blainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	brèdes mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagie, komkommerkruid	bourrache, bourrache officinale	bloem, zaad	fleur, graine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengrondse delen	parties aériennes		
Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		wierookboom	arbre à encens	gomhars	gomme-résine		
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		wierookboom	encens	oliehars	oléorésine		

Brassica cretica Lam.	Brassicaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae		zwarte mosterd	moutarde noire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica oleracea L.	Brassicaceae		incl. tuinkool	incl. chou potager	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Brassica rapa L.	Brassicaceae	Sinapis juncea L.	raapzaad	navette d'été	hele plant	plante entière		

Buglossiodes arvensis	Boraginaceae					olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae		sikkelgoudschem	buplèvre chinois	wortel		racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling)	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le antidiabète
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae		doorwas	buplèvre à feuilles rondes	bovengrondse delen		parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement

									anti-diabétique behandeling.	contre le diabète.
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae							vrucht, schors	fruit, écorce	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophylotoxin e et analogues.
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosae							schors, zaad	écorce, graine	
Cakile maritima Scop.	Brassicaceae							blad, wortel	feuille, racine	
Calendula arvensis (Vaill.) L.	Compositae							bloem	fleur	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie.
Calendula officinalis L.	Compositae							bovengrondse delen	parties aériennes	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie.
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae							bovengrondse delen	parties aériennes	

Camelina sativa (L.) Crantz	Brassicaceae			huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter	cameline, lin bâtard	zaad	graine		
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Theaceae			theestruik	théier	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 600 mg looistoffen (uitgedrukt als epigallocatechin e-3-gallate). Enkel het gebruik van volgende extractievloeisto ffen zijn toegelaten: water, alcohol met een maximumgehalt e van 25 %.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de tanins (exprimé en épigallocatechin e-3-gallate) supérieure à 600 mg. Seule l'utilisation des solvants d'extraction suivants est acceptée: eau, alcool avec une teneur maximale de 25%.
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae			ylang-ylang	ylang-ylang, canang odorant	bloem	fleur	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 3 mg safrol.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de safrole supérieure à 3 mg.
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseraceae					noot	noix		
Capparis spinosa L.	Capparaceae			kappertjes	câprier commun, câprier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Brassicaceae		gewoon herderstasje	bourse-à-pasteur commune	bovengrondse delen	parties aériennes	
Capsicum annuum L.	Solanaceae	Capsicum frutescens L.	spaanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée	vrucht	fruit	
Carex arenaria L.	Cyperaceae		zandzegge	laïche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome	
Carica papaya L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papayer	vrucht	fruit	
Carissa carandas L.	Apocynaceae		kristusdoorn	karonda	vrucht, blad	fruit, feuille	
Carlina acaulis L.	Compositae		zilverdistel	carline acaule	wortel	racine	
Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		hoge zilverdistel	carline argentée	wortel	racine	
Carpinus betulus L.	Betulaceae		haagbeuk	charme	knop, blad	bourgeon, feuille	
Carthamus lanatus L.	Compositae			carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur	
Carthamus tinctorius L.	Compositae		saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine	
Carum carvi L.	Apiaceae		echte karwij	carvi, cumin de près	vrucht	fruit	
Cassia fistula L.	Leguminosae		indische goudenregen	canéficier, cassier	vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) hoger dan 18 mg. De

							analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen; - Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Castanea sativa Mill.	Fagaceae		tamme kastanje	châtaigner, châtaignier commun	schors, bladknop, blad, zaad	écorce, bourgeon de feuille, graine		
Catalpa bignonioides Walter	Bignoniaceae		groene trompetboom	catalpa bignioïdes, arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun	blad	feuille		
Ceanothus americanus L.	Rhamnaceae		amerikaanse sering	thé du new jersey	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloiden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en

<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	<i>Erythraea centaurium</i> (L.) Pers.	echt duizendguldenkru id	erythrée petite centauree	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.	gotu kola	hydrocotyle d'asie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC	Caprifoliaceae		rode spoorbloem, rode valeriaan	valériane rouge, centranthe rouge	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valepotriaten bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en valépotriates.
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	Rosaceae		weichselboom	bois de sainte-lucie, cerisier de sainte-lucie, faux merisier	zaad	graine		
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae		johannesbroodboom	caroubier	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae		judasboom	arbre de judée, gainier	vrucht, gomme van het zaad	fruit, gomme de la graine		
<i>Cetraria islandica</i> (L.)	Parmeliaceae		ijslands mos	lichen d'islande	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Chaenomeles speciosa</i> Nakai	Rosaceae		chinese sierkwee	cognassier de chine	vrucht	fruit		

Chamaemelum nobile (L.) All.	Compositae	Anthemis nobilis L.	roomse kamille	camomille romaine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Chamaecrista nomame (Sieber) H.Ohashi	Leguminosae	Cassia nomame (Sieber) Honda			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille		
Chelone glabra L.	Plantaginaceae		schildpadbloem	tête de tortue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Chenopodium quinoa Willd.	Amaranthaceae		quinoa	quinoa	gewassen zaden	graines lavées		
Chenopodium vulvaria L.	Amaranthaceae		stinkende ganzenvoet	vulvaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.	Ericaceae	Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl	pijsissewa	chimaphila à ombelles, pirole en ombelle	hele plant	plante entière		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiaceae			bejuco de berac	wortel	racine		
Chionanthus virginicus L.	Oleaceae		sneeuwvlokkenbo om	arbres à neige	wortelschors	écorce de racine		
Chlorella vulgaris Beijerinck	Chlorellaceae	Chlorella pyrenoidosa H. Chick, Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	ééncellige alg	algue unicellulaire		
Chondrus crispus Stackhouse	Gigartinaceae		iers moswier	varech, mousse d'Irlande	thallus	thallus		
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke	Compositae			chrysanthellum	bloeiende toppen	sommités fleuries		

<i>Chrysanthellum indicum</i> subsp. afroamericanum B.L. Turner	Asteraceae		gele kamille	camomille d'or	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	caimitier, cainite	vrucht	fruit		
<i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty	Poaceae		vétiver	vétiver	wortel	racine		
<i>Cichorium endivia</i> L.	Compositae		andijvie	chicorée endive	blad	feuille		
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae		wilde cichorei	chicorée sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.	Rubiaceae	<i>Cinchona ledgeriana</i> (Howard) Bern.Moens ex Trimen	kinaboom, quinaboom	quinaquina jaune, quinquina calisaya	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona lancifolia</i> Mutis	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg.

								volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona micrantha Ruiz & Pav.	Rubiaceae						schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona nitida Ruiz & Pav.	Rubiaceae						schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Cinchona officialis L.	Rubiaceae			kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	enfants de moins de 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae					schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pubescens Vahl	Rubiaceae			rode kinaboom, rode kinine	quinquina rouge	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommandée ne doit pas

							een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl	Lauraceae		kamferboom	camphrier, laurier du japon	hele plant	plante entière		
Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	Cinnamomum aromaticum Nees	chinese kaneel	cannelier de chine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cinnamomum verum J.Presl.	Lauraceae	Cinnamomum zeylanicum Blume, C. zeylanicum Nees	chinese kaneel, kaneelboom	cannelle de chine, cannelier	schors, blad	écorce, feuille		
Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae				stengel	tige		
Cistus creticus L.	Cistaceae	Cistus ladaniferus Stokes	rotsroos	ciste de crête	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Cistus × incanus L.	Cistaceae		cistusroos	ciste à gomme	hele plant	plante entière		
Cistus monspeliensis L.	Cistaceae		rotsroos	ciste de montpellier	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Citrullus lanatus (Thunb.)	Cucurbitaceae		watermeloen	pastèque	vrucht, zaad	fruit, graine		

Matsum. & Nakai								
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	lime, limettier	vrucht	fruit		
Citrus aurantium L.	Rutaceae	Citrus aurantium L. ssp. amara Engl., Citrus aurantium L. ssp. sinensis L., Citrus aurantium L. ssp. aurantium L., Citrus aurantium var. dulcis	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	orange amère, bigaradier orange de curaçao	bloem, vrucht, pericarp	fleur, fruit, péricarpe	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van para-synéphrine hoger dan 20 mg. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden meta-synéphrine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld	Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de para-synéphrine supérieure à 20 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en méta-synéphrine. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : - Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement . Ne pas utiliser en cas de traitement anti-

								worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen.	hypertenseur . Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans . Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité.
Citrus x limon (L.) Osbeck	Rutaceae	Citrus limon (L.) Burm. f.	citroenboom, limoen	citron, citronnier	bovengrondse delen	parties aériennes			
Citrus maxima (Burm.) Merr.	Rutaceae	Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decumana L.	pompelmoesboom	pamplemoussier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine			
Citrus medica L.	Rutaceae		sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédratier	vrucht, zaad	fruit, graine			
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae	Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chínotto	chinois	vrucht, pericarp	fruit, péricarpe			
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae				vrucht	fruit			
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae		grapefruit	grapefruit	bovengrondse delen	parties aériennes			
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae		mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarijnier, clémentine	bovengrondse delen	parties aériennes			
Citrus sinensis (L.) Osbeck	Rutaceae		sinaasappel	oranger	bloem, blad, vrucht	fleur, feuille, fruit			

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		echt rendiermos	lichen des rennes, lichen des caribous	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculaceae		bosrank	clématite d'armand	gedroogde stengel	tige séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	racine séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat

								aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	botanische moet demonstreren dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball	borstelkrans	clinopode, clinopode commun, sariette vulgaire	blad	feuille			
Clinopodium vulgare L.	Lamiaceae	Calamintha vulgaris (L.) Druce	kittelbloem	pois bleu	bovengrondse delen	parties aériennes			
Clitoria ternatea L.	Leguminosae				bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.	
Cnicus benedictus L.	Compositae		gezegende distel	chardon-bénit	bovengrondse delen	parties aériennes			
Cochlearia officinalis L.	Brassicaceae		echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson	bovengrondse delen	parties aériennes			
Cocos nucifera L.	Arecaceae		kokospalm	cocotier	zaad, vette olie	graine, huile grasse			
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.	Campanulaceae		codonopsis	codonopsis	wortel	racine			
Coffea arabica L.	Rubiaceae		koffie (boom)	caféier	zaad	graine			
Coffea canephora Pierre ex Froehner	Rubiaceae	Coffea robusta	robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine			

		Lind. ex De Wild								
Coix lacryma-jobi L.	Poaceae		jobstranen		larmes de job	zaad		graine		
Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	Coix ma-yuen Rom. Caill.	jobstranen		larmes de job	zaad, olie van het zaad		graine, huile de la graine		
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom		noix de cola, colatier	zaad		graine		
Cola nitida (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom		noix de cola, colatier	zaad		graine		
Coleus forskohlii (Poir.) Briq.	Lamiaceae					bovengrondse delen, wortel		parties aériennes, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Combretum micranthum G.Don	combretaceae		kinkeliba		kinkeliba	blad		feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

Combretum sundaicum Miq.	Combretaceae					blad, bladsteel	feuille, pédoncule		gebruik van antidiabetische behandeling.	concomitant de traitement contre le diabète.
Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseraceae				afrikaanse mirre	gomhars	gomme- résine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.	Burseraceae					gomhars	gomme- résine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora mukul Engl.	Burseraceae				guggul	olie-gomhars	Oleo- gomme- résine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora myrrha (Nees) Engl.	Burseraceae				mirre	olie-gomhars	oleo gomme- résine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de

Commiphora schimperi (O.Bergman) Engl.	Burseraceae							gomhars	gomme-résine	gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	grosesse ou d'allaitement. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Conyza canadensis (L.) Cronquist	Compositae					Erigeron canadensis L.	canadese fijnstraal	vergerette du cananda, conyze du canada	hele plant	plante entière	
Copaifera langsdorffii Desf.	Leguminosae							olichars van de schors	oléorésine de l'écorce		
Coptis japonica (Thunb.) Makino	Ranunculaceae							wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als copisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en copisine) supérieure à 10 mg.
Coptis teeta Wall.	Ranunculaceae							wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes

<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Ranunculaceae				coptide trifoliée	wortelstok	rhizome	(uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
<i>Corallina officinalis</i> L.	Corallinaceae					thallus	thallus		
<i>Cordia myxa</i> L.	Boraginaceae		sebestenboom			vrucht	fruit	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alkaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		koriander		coriandre	bovengrondse delen, olie van het zaad	parties aériennes, huile de graine	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97	Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97

							en (EU) 2015/2283).	et (UE) 2015/2283).
<i>Cornus florida</i> L.	Cornaceae		grootbloemige amerikaanse kornoelje	cornouiller à fleurs d'amérique, bois-de-chien	vrucht, schors	fruit, écorce		
<i>Cornus mas</i> L.	Cornaceae		gele kornoelje	cornouiller mâle	vrucht	fruit		
<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	Cornaceae		japanse kornoelje	cornouiller officinal	vrucht	fruit		
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornaceae		rode kornoelje	cornouiller sanguin, sanguin	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr.	Molluginaceae			corrigiole à feuilles de téléphium	wortel	racine		
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae		hazelaar	noisetier, coudrier	bladknop, blad, vrucht, zaad	bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine		
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	citroen eucalyptus	eucalyptus citronné	blad	feuille		
<i>Coscinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae				wortel, stengel	racine, tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Crambe maritima</i> L.	Brassicaceae		zeekool	chou marin, crambé maritime	hele plant	plante entière		

Crataegus azarolus L.	Rosaceae		azarooldoorn	azarolier, azérolier	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus curvisepala Lindm.	Rosaceae		koraalmeidoorn	aubépine à feuilles en éventail	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Rosaceae	Crataegus oxyacantha auct.	tweestijlige meidoorn	aubépine à deux styles	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides

Crataegus monogyna Jacq.	Rosaceae					aubépine à un style	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	supérieure à 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.	Rosaceae						vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crithmum maritimum L.	Apiaceae					fenouil marin, perce-pierre	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Crocus sativus L.	Iridaceae					safran	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter les avertissements

							waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling.	suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.
Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Cruciata laevipes Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwalstro	gaillet croisette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensara aromatica Sonn.; Agathophyll um aromaticum (Sonn.) Willd	ravensara	ravensara aromatique, ravensara aromatica	vrucht	fruit		
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae		meloen	melon	vrucht, zaad	fruit, graine		
Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae		comcommer	concombre	vrucht	fruit		
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae		reuzenpompoen	potiron	vrucht	fruit		
Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae		courgette, pompoen, sierpompoen	courge, pépon, citrouille	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Cuminum cuminum L.	Apiaceae		komijn	cumin officinal	vrucht	fruit		
Cupressus sempervirens L.	Cupressaceae		italiaanse cipres	cyprès provençal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		

Curcuma longa L.	Zingiberaceae	Curcuma domestica Val, Curcuma domestic Loir., Amomum curcuma Jacq	kurkuma	curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consult ez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	curcuma	wortelstok	rhizome		
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javaanse curcuma, zedoarwortelstok	safran de java, zedoaire	wortelstok	rhizome		
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulaceae		duivelsnaaigaren	cuscuta de chine	zaad	graine		
Cuscuta epithymum Murray	Convolvulaceae		klein warkruid	cuscuta du thym, cuscuta à petites fleurs, petite cuscuta	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Leguminosae		guarplant	plante à guar	zaad, gom	graine, gomme		
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrab.	Cucurbitaceae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, cyclanthère à feuilles digitées	vrucht, blad	fruit, feuille		

Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kvee	cognassier	vrucht	fruit		
Cymbopogon citratu (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	citronelle, lemongrass de l'amerique centrale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon javanicus subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon javanicus (Desf.) Duthie			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon nardus (L.) Rendle	Poaceae		citronella	verveine des indes, citronnelle des indes	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.	Poaceae	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras		bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon winterianus Jovitt ex Bor	Poaceae		java citronella	citronelle de java	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cynara cardunculus L.	Compositae		kardoen	cardon	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cynara scolymus L.	Compositae		artisjok	artichaut	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cyperus rotundus L.	Cyperaceae		notengras	souchet rond	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de

							tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	grossesse ou d'allaitement.
Cytinus hypocistis (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	fleur, jus		
Daemonorops draco (Willd.) Blume	Arecaceae	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus draco Willd.			vrucht, hars	fruit, résine		
Dahlia pinnata Cav.	Compositae	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia commun	wortel	racine		
Daucus carota L.	Apiaceae		peen	carotte	wortel, zaad	racine, graine		
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.	Compositae		tuinchrysant	chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème horticole	bloem, blad	fleur, feuille		
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		sofiekruid	l'herbe de sainte sophie	blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine. supérieure à 5 mg.
Desmodium adscendens DC.			Desmodium	Desmodium	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptam ine derivaten en	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la

							alkaloïden van het type beta-carboline (type harmane) bevat	diméthyltryptamine ni d'alcaloïdes de type bêta-carboline (type harmane)
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae		tuinanjere	oeillet des fleuristes	bloem	fleur		
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	<i>Euphoria longan</i> (Lour.) Steud.	longan	longane	zaadmantel, bloem, vrucht	arille, fleur, fruit		
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae			igname ailée, grande igname, cambarre	wortelknol	tubercule	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Dioscorea collettii</i> Hook. f. var. <i>hypoglauca</i> (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Dioscorea composita</i> Hemsl.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule		
<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	yam	yam	wortel, wortelstok	racine, rhizome		
<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> Decne	yamswortel, chinese igname	igname	wortelstok	rhizome		
<i>Dioscorea villosa</i> L.	Dioscoreaceae		wilde yam	igname indigène	wortelknol	tubercule		
<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	Ebenaceae		kaki	kaki, plaqueminier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		

Diospyros virginiana L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoon	plaquemines de virginie.	vrucht, olie van het zaad	fruit, huile de graine		
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC	Brassicaceae		grote zandkool, wilde rucola	diplotaxis à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
Dipsacus fullonum L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier	wortel	racine		
Dipsacus incarnis Wall.	Caprifoliaceae	Dipsacus asper Wallich, Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai	sechuan kaardebol, xu duan	xu duan	wortel	racine		
Dipsacus japonicus Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	dipsacus japonicus miq.	wortel	racine		
Dorstenia contrajerva L.	Moraceae				wortel	racine		
Dracocephalum moldavica L.	Lamiaceae			thé des jardins, tête de dragon, mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae			écorce de winter, foye, canelo	bast	liber		
Drosera anglica Huds.	Droseraceae	Drosera longifolia L.	lange zonnedauw	rossolis d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

Drosera intermedia Hayne	Droseraceae			kleine zonnedauw	Drosera intermediaire	hele plant	plante entière	hoeveelheden naftochinonen bevat. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	quantité détectable en naftoquinones. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naftoquinones.
Drosera peltata Thunb.	Droseraceae					bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naftoquinones.
Drosera ramentacea Burch ex DC	Droseraceae					hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naftoquinones.
Drosera rotundifolia L.	Droseraceae			ronde zonnedauw	drosera, rossolis à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naftoquinones.
Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae			Haematococcus salinus Dunal					
Durvillea antarctica (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae			Fucus antarcticus Chamisso		thallus	thallus		

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium botrys L.	druifkruid		bloeiwijzen	inflorescences	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Echinacea angustifolia DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	échinacée à feuilles étroites	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de racine séchée.
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	échinacée pâle	hele plant	plante entière	Voor voedingssupple- menten met bereidingen van de wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.

Echinacea purpurea (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoed	echinacée pourpre	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde kruid.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2 g d'herbe séchée.
Echium plantagineum L.	Boraginaceae		slangenkruid	vipérine faux- plantain	olie van het zaad	huile de la graine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg. Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell	Lessoniaceae		aramé	aramé	thallus	thallus		
Elaeis guineensis Jacq.	Arecaceae		oliepalm	palmier à huile d'afrique	olie van de pit	huile de noyaux		
Elettaria cardamomum (L.) Maton.	Zingiberaceae		echte kardemom, kardoem	cardamome	zaad	graine		

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae	Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms.	Siberische ginseng	eleuthérocoque	wortel	racine		
Elymus repens (L.) Gould	Poaceae	Agropyron repens (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel chiendent des sables	chiendent commun, chiendent rampant	wortelstok	rhizome		
Embelia ribes Burm.f.	Primulaceae				wortel, blad, vrucht	racine, feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Epilobium angustifolium L.	Onagraceae		gewoon wilgenroosje	epilobe en épi, epilobe à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes		
Epilobium parviflorum Schreb.	Onagraceae		viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgeroosje	epilobe à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Equisetum arvense L.	Equisetaceae		heermoes	prêle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Equisetum fluviatile L.	Equisetaceae		holpijp	prêle des eaux	bovengrondse delen	parties aériennes		
Equisetum hyemale L.	Equisetaceae		schaafstro	prêle d'hiver	bovengrondse delen	parties aériennes		
Equisetum telmateia Ehrh.	Equisetaceae		reuzenpaardensta art	grande prêle, grande queue-de- cheval	bovengrondse delen	parties aériennes		
Erica cinerea L.	Ericaceae		rode dophei	bruyère cendrée	bloeiwijze	inflorescenc es		
Erica tetralix L.	Ericaceae		gewone dophei	bruyère quaternée,	bloem	fleur		

				bruyère à quatre angles, caminet				
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		japanse mispel, loquat	néflier du japon, bibassier	blad, zaad	feuille, graine		
Eriodictyon californicum (Hook. et Arn.) Torr.	Boraginaceae		heilig kruid, yerba sancta	herbe sainte	bovengrondse delen	parties aériennes		
Erodium cicutarium L. 'Hérit.	Geraniaceae		gewone reigersbek	bec-de-cigogne commun, erodium à feuilles de ciguë	hele plant	plante entière		
Eruca vesicaria L. Cav.	Brassicaceae	Eruca sativa Mill.	Rucola, raketsla	roquette	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
Eryngium campestre L.	Apiaceae		echte kruisdistel	panicaut champêtre, chardon roulant	bovengrondse delen	parties aériennes		
Eschscholtzia californica Cham.	Papaveraceae		slaapmutsje	eschscholtzia de californie, pavot jaune de californie	bovengrondse delen	parties aériennes		
Eucalyptus dives Schauer	Myrtaceae		pepermunt eucalyptus	eucalyptus mentholé	blad, twijg	feuille, brindille		
Eucalyptus globulus Labill.	Myrtaceae		eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, arbre à fièvre, gommier bleu	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Eucalyptus odorata Behr	Myrtaceae				blad	feuille		

Eucalyptus radiata Sieber ex DC.	Myrtaceae			eucalyptus radié	blad	feuille		
Eucalyptus smithii R.T.Baker	Myrtaceae				schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Eucheuma horridum J. Agardh	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucheuma spinosum J. Agardh.	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucommia ulmoides Oliv.	Eucommiaceae		gutta-percha boom, chinese rubberboom	arbre à gutta-percha	schors	écorce		
Eugenia uniflora L.	Myrtaceae		surinaamse kers	ceriser de cayenne	schors, bloem, vrucht, blad	écorce, fleur, fruit, feuille		
Euphrasia rostkoviana Hayne	Orobanchaceae	Euphrasia officinalis L.	beklierde ogentroost	euphrase glanduleuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		stijve ogentroost, ogentroost	euphrase raide, euphrase glanduleuse, casse-lunettes	bovengrondse delen	parties aériennes		
Euterpe oleracea Mart.	Arecaceae		açai	açai	vrucht, zaad	fruit, graine		
Evernia prunastri (L.) Ach.	Parmeliaceae		eikmos, gewoon geweimos	evernia, lichen de chêne, mousse de chêne	thallus	thallus		
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.	Rubiaceae				schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

									gebruik van antidiabetische behandeling.	concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav	Solanaceae						hele plant	plante entière		
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae						bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae						schors, knop, vrucht	ecorce, bourgeon, fruit		
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae						hele plant	plante entière		
<i>Ferula assa- foetida</i> L.	Apiaceae						wortel, gomhars	racine, gomme- résine		
<i>Ficus benghalensis</i> L.	Moraceae						schors, vrucht	écorce, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae						hele plant	plante entière		
<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae						schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter l'avertissement

							waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim	Rosaceae	Spirea ulmaria L.	moerasspirea, geitenbaard	reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Filipendula vulgaris Moench.	Rosaceae		knolspirea	spirée filipendule	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants

							mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : -Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Frangula purshiana Cooper	Rhamnaceae	Rhamnus purshiana DC.	cascara	cascara, écorce sacrée	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als cascarioside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en cascarioside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour

							producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Fraxinus excelsior L.	Oleaceae		gewone es	frêne commun	bovengrondse delen	parties aériennes		
Fraxinus ornus L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	blad, manna	feuille, manne		
Fucus serratus L.	Fucaceae		zaagwier	varech denté	thallus	thallus		
Fucus vesiculosus L.	Fucaceae		fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	thallus	thallus		
Fumaria officinalis L.	Papaveraceae		gewone duivekervel	fumeterre officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galeopsis segetum Neck.	Lamiaceae	Galeopsis ochroleuca Lam.	bleekgele hennepnetel	galéopsis des champs, chanvre bâtard	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium aparine L.	Rubiaceae		kleefkruid	gaillet gratteron, rièble, grateron, gratte-langue, gaille	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium mollugo L.	Rubiaceae		glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium odoratum (L.) Scop.	Rubiaceae	Asperula odorata L.	liebevrouwebedstro	on la connaît aussi sous les noms de "rièble",	bovengrondse delen	parties aériennes		

				"grateron", "gratte-langue", "gaille".				
<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae		geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Garcinia × mangostana</i> L.	Clusiaceae		mangostan	mangoustanier	vrucht	fruit		
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb..	Clusiaceae	<i>Garcinia cambogia</i> (Gaernt) Desr.	guttegomboom	guttier	gomhars	gomme-résine		
<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Rubiaceae	<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merr.	gardenia	gardénie commun, jasmin du cap	hele plant	plante entière		
<i>Gastrodia elata</i> Blume	Orchidaceae				hele plant	plante entière		
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae		liggende bergthee	gaulthérie du canada	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Gelidium amansii</i> J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus		
<i>Gelidium sesquipedale</i> (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		agar agar	agar agar	thallus	thallus		
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae		gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Geranium maculatum</i> L.	Geraniaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae		beemdooievaarsbek	géranium des prés	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae		robertskruid	géranium herbe à robert	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbek	géranium sanguin, herbe à becquet	bovengrondse delen	parties aériennes		

Geum rivale L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	benoîte des ruisseaux, benoite des ruisseaux	hele plant	plante entière		
Geum urbanum L.	Rosaceae		geel nagelkruid	benoîte commune	hele plant	plante entière		
Ginkgo biloba L.	Ginkgoaceae		ginkgo	ginkgo, arbre des pagodes, arbre aux quarante écus	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglycosid en hoger dan 21,6 mg en van terpeenlactonen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	La portion journalière <i>recommandée</i> ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.
Glycine max (L.) Merr.	Leguminosae		soja	soja	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen	La portion journalière <i>recommandée</i> ne doit pas conduire à une ingestion

							(uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout	réglisse	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.	Leguminosae		chinees zoethout	réglisse de l'oural, réglisse de sibérie	wortel, wortelstok, stolon	racine, rhizome, stolon	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée

							niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Gossypium herbaceum L.	Malvaceae			katoenplant, oosters katoen	cotonnier	pilus, wortel, zaad	pilus, racine, graine	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gossypium hirsutum L.	Malvaceae			behaarde katoen	coton mexicain	zaad	graine	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M.	Gracilariaceae			knoopwier		thallus	thallus	

									gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae				pluimgipskruid	gypsophile paniculée	wortel	racine		
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcaceae				bloedregenalg	haematococcus pluvialis	éénellige alg	algue unicellulaire		
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae				campechehout	bois de campêche	ongefermenteerd kernhout	duramen non fermenté		
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae				virginische toverhazelaar	hamamelis de virginie	schors, blad	écorce, feuille		
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae						bovengrondse delen	parties aériennes		
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae				duivelsklauw	griffe du diable	secundaire wortelknol	tubercule secondaire	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal indoiïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'indoiïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou

Harpagophytum zeyheri Decne.	Pedaliaceae			griffe du diable, plante-grappin, araignée de bois	wortel, wortelknol	racine, tubercule	darmzweren of galstenen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	duodéal ou de calculs biliaires. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodéal ou de calculs biliaires.
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze	braziliaanse ginseng	suma, le ginseng brésilien, pfaffia	wortel	racine		
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hédéome	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	lierre	blad	feuille	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemming met de volgende maximale dagelijkse dosis:	Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondantes :

a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent ethanol 24-30% m/m	a) extrait sec (DER 4-8:1), solvant d'extraction éthanol 24-30% m/m
b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m	b) extrait sec (DER 6-7:1), solvant d'extraction éthanol 40% m/m
c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m	c) extrait sec (DER 3-6:1), solvant d'extraction éthanol 60% m/m
d) vloeibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v	d) extrait fluide (DER 1:1), solvant d'extraction éthanol 70% v/v
e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v: propylene glycol (98:2)	e) extrait mou (DER 2.2-2.9:1), solvant d'extraction éthanol 50% v/v: propylène glycol (98:2)
Maximale dagelijkse dosis : Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen :	Doses journalières maximales : Adolescents à partir de 12 ans et adultes :
a) 31 mg	
b) 29 mg	
c) 46 mg	
d) 210 mg	
e) 84 mg	

							Kinderen van 6 tot 11 jaar : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Kinderen van 3 tot 5 jaar : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg	a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Enfants de 6 à 11 ans : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Enfants de 3 à 5 ans : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg
Hedychium coronarium J. Koenig	Zingiberaceae				bloem, wortelstok	fleur, rhizome		
Helianthus annuus L.	Compositae		gewone zonnebloem	tournesol commun, grand soleil	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helianthus tuberosus L.	Compositae		aardpeer	topinambour, hélianthe tubéreux	knol	tubercule		
Helichrysum arenarium (L.) Moench.	Compositae		strobloem, zandstrobloem	immortelle des sables	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.	Compositae		kerrieplant	immortelle d'italie	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	immortelle stoechade	bovengrondse delen	parties aériennes		
Heracleum sphondylium L.	Apiaceae		gewone berenklauw	berce commune	hele plant	plante entière		

<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae		kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière		
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Caryophyllaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Brassicaceae		damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée des dames, violette de damas, aragone	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazuring	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine		
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae		muizenoor	epervière piloselle	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.	Poaceae	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Wahl.	veenreukgras	hierochloë odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Himanthalia elongata</i> (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		riemwier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus		
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Eleagnaceae		duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao	hai zao, hiziki, hiziki	thallus	thallus		

Hordeum vulgare L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zesrijige gerst	incl. orge carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe		
Houttuynia cordata Thunb.	Saururaceae				hele plant	plante entière		
Humulus lupulus L.	Cannabaceae		hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescenc es	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8- prenylnaringenin e hoger dan 400 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8- prénylnaringénin e supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	Lycopodium serratum Thunb.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Hydrastis canadensis L.	Ranunculaceae		canadese geelwortel	hydraste du canada	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbéline) supérieure à 10 mg.
Hygrophila auriculata	Acanthaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		

(Schumach.) Heine								
Hymenaea courbaril L.	Leguminosae		lokusboom, gomcopal	courbaril	schors, fruit, blad, zaad, hars	écorce, fruit, feuille, graine, résine		
Hypericum perforatum L.	Hyperaceae		sint-janskruid	millepertuis perforé, millepertuis commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker informer.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypéricine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.
Hyssopus officinalis L.	Lamiaceae		hyssop	hysope	bovengrondse delen	parties aériennes		
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.	Aquifoliaceae		mate	maté	blad	feuille		
Illicium verum Hook. f.	Schisandraceae		chinese steranijs	anis étoilé de chine	schors, vrucht	écorce, fruit		

Impatiens balsamina L.	Balsaminaceae		tuinbalsemien	balsamine des jardins	bovengrondse delen	parties aériennes		
Indigofera tinctoria L.	Leguminosae		indigostruik	indigotier	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine.
Inula britannica L.	Compositae		engelse alant	inule des fleuves, inule britannique	bovengrondse delen	parties aériennes		
Inula helenium L.	Compositae		griekse alant	inule grande aunée	blad, wortelstok, wortel	feuille, rhizome, racine		
Ipomoea batatas (L.) Poir	Convolvulaceae		zoete aardappel	patate douce	knol	tubercule		
Isatis tinctoria L.	Brassicaceae		wede	pastel	bovengrondse delen, sap	parties aériennes, jus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.
Jasminum grandiflorum L.	Oleaceae		grootbloemige jasmijn	jasmin à grandes fleurs	bloem	fleur		

Jasminum officinale L.	Oleaceae		gewone jasmijn	jasmin commun	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Jateorhiza palmata (Lam.) Miets	Menispermaceae	Menispermum palmatum Lam.	kolombo, calumbo	racine de colombo	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloides d'isochinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Juglans cinerea L.	Juglandaceae		witte walnoot, boternoot	noyer cendré, noyer blanc, noyer à beurre	zaad	graine		
Juglans regia L.	Juglandaceae		okkernoot	noyer royal	bovengrondse delen	parties aériennes		
Jumellea fragrans (Thouars) Schltr.	Orchidaceae				blad	feuille		
Juniperus communis L.	Cupressaceae		gewone jeneverbes	genévrier commun	vrucht, blad, hout	fruit, feuille, bois	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht : De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fruit : L'etiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation

							gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.
Justicia adhatoda L.	Acanthaceae	Adhatoda vasica Nees	malabarnoot, adalsa, arusa	noix de malabar	hele plant	plante entière		
Justicia pectoralis Jacq.	Acanthaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Kaempferia galanga L.	Zingiberaceae		kentjoer		wortelstok	rhizome		
Kavalama urens (Roxb.) Raf.	Malvaceae	Sterculia urens Roxb.			gom	gomme		
Kickxia spuria (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek	linaire bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes		
Knautia arvensis (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon	knautie des champs, scabieuse des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	Krameria triandra Ruiz & Pav.	ratanhia	ratanhia	wortel	racine		
Lactuca indica L.	Compositae		chinese sla		bovengrondse delen	parties aériennes		
Lactuca sativa L.	Compositae		sla	aitue, laitue cultivée, salade	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.	Lythraceae		banaba	lilas des indes, queens crape myrtle, banaba	blad	feuille		
Laminaria digitata	Laminariaceae		gladgesteeld vingerwier	laminaire digitée	thallus	thallus		

(Hudson) J.V. Lam.								
Laminaria hyperborea (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vinger wier	laminaire hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus		
Laminaria japonica J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp	Laminaire	thallus	thallus		
Laminaria palmata Bory de St.Vincent	Laminariaceae				thallus	thallus		
Lamium album L.	Lamiaceae		witte dovenetel	lamier blanc	bovengrondse delen	parties aériennes		
Larix decidua Mill.	Pinaceae		europese lork, lork	mélèze d'europe, mélèze, mélèze commun	bovengrondse delen, hars	parties aériennes, résine		
Larix occidentalis Nutt.	Pinaceae		west amerikaanse lork	mélèze de l'ouest	hele plant	plante entière		
Laurus nobilis L.	Lauraceae		laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad	fruit, feuille		
Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.	Lamiaceae		lavendel	lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lavandula angustifolia Mill.	Lamiaceae	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia, Lavandula officinalis Chaix, Lavandula spica L.	lavendel	lavande	bloeiende top	sommités fleuries		
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea	Lamiaceae	Lavandula vera DC.	lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités fleuries		

Lavandula latifolia Medik	Lamiaceae	Lavandula hybrida E.Rev. ex Briq.	breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lavandula stoechas L.	Lamiaceae		franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon, lavande à toupet	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lawsonia inermis L.	Lythraceae		henna	henné	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Ledum palustre L.	Ericaceae		moerasrozemarijn ; moeraspalm	lédon, lédum des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lens culinaris Medik.	Leguminosae		linze	lentille cultivée	zaad	graine		
Leonurus cardiaca L.	Lamiaceae		hartgespan	agripaume	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Leonurus japonicus Houtt.	Lamiaceae	Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu, Leonurus			bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne

			heterophyllus Sweet					gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Brassicaceae			veldkruiders	passerage champêtre	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae					bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium latifolium L.	Brassicaceae			peperkers	grande passerage, passerage à feuilles larges	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en

Lepidium meyenii Walp.	Brassicaceae	Lepidium peruvianum G. Chacón de Popovici	maca	maca	wortel	racine	personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	hypothyreoïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium sativum L.	Brassicaceae		tuinkers	cresson alénois, passerage cultivé	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Leptospermum petersonii subsp. petersonii.	Myrtaceae	Leptospermum citratum (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold			bloeiende toppen	sommités fleuries		
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae		manuka	manuka	schors, blad	écorce, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Lеспедеза capitata Michx.	Leguminosae		lespedeza	lespedeza	bovengrondse delen	parties aériennes		
Leucanthemum vulgare (Vall.) Lam.	Compositae		gewone margriet	marguerite, marguerite commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Levisticum officinale W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	céleri perpétuel, livèche, herbe-à-maggi	hele plant	plante entière		

Ligusticum striatum DC.	Apiaceae	Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch.			wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Lilium brownii F.E. Br. ex Mieliez	Liliaceae				bol	bulbe	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	racine		
Linum usitatissimum L.	Linaceae		gekweekt vlas	lin cultivé	zaad	graine		
Liquidambar styraciflua L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	copalme d' amérique	schors	écorce		
Litchi chinensis Sonn.	Sapindaceae		lychee	litchi, letchi	vrucht, zaad	fruit, graine		
Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug	Hapalidiaceae		lithothamnium calcareum	lithothamne	thallus	thallus		
Litsea cubeba (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobariaceae		longenmos	pulmonaire	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliaceae		japanse kamperfoelie	chèvrefeuille du japon	bloem, steel	fleur, tige		
Lotus corniculatus L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant	plante entière		
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	bovengrondse delen	parties aériennes		
Luma chequen (Molina) A.Gray	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.			blad	feuille		
Lycium barbarum L.	Solanaceae	Lycium halimifolium Mill.	boksdooorn	lyciet commun, lyciet de barbarie	vrucht	fruit		
Lycium chinense Mill.	Solanaceae		chinese boksdooorn	lyciet de chine	vrucht	fruit		
Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae	Solanum lycopersicum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst.	tomaat	tomate	vrucht	fruit		

<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopodiaceae		grote wolfsklauw	lycopode en massue	bovengrondse delen, spoor	Parties aériennes, spore		
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	<i>L. mollis</i> A.Kern., <i>Lycopus menthifolius</i> Mabilie	wolfspoot	lycope, lycopoie d'europe, chanvre d'eau	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lycopus virginicus</i> Michx.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		grote wederik	lysimaque commune, grande lysimaque	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		grote kattenstaart	salicaire commune	toppen	sommité	De etikettering moet de	L'étiquetage doit comporter

Malus domestica Borkh.	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf	eetappel	pommier commun	hele plant	plante entière		
Malus pumila Mill.	Rosaceae		paradijsappelboom	pommier paradis	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon, fleur, fruit, feuille		
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris	Rosaceae		wilde appel	pommier sauvage	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon, fleur, fruit, feuille		
Malva sylvestris L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	mauve sauvage, fromageon, petit fromage, fouassier	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mammea americana L.	Calophyllaceae		amerikaanse mammi-appel	abricotier des antilles, abricotier-pays	pulp van de vrucht	pulpe du fruit		
Mangifera indica L.	Anacardiaceae		mango	manguier	hele plant	plante entière		
Manihot esculenta Crantz	Euphorbiaceae		cassave, maniok	manioc	gekookte wortel	racine cuite		
Manilkara zapota (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapotillier	vrucht, bloem	fruit, fleur		
Maranta arundinacea L.	Marantaceae		pijlwortel	marante, dictame, herbe aux flèches	bol, wortelstok	buble, rhizome		
Marchantia polymorpha L.	Marchantiaceae		parapluitjesmos	hépatique des fontaines	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Marrubium vulgare L.	Lamiaceae		makrove	marrube	bovengrondse delen	parties aériennes		
Marsdenia cundurango Rchb.f.	Apocynaceae	Marsdenia reichenbachii i Triana	condurango	condurango	schors	écorce		
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.			blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry	Phyllophoraceae		kernwier		thallus	thallus		
Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert	echte kamille	matricaire camomille, camomille vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupple- menten met bereidingen van de bloem of blad : De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van α -bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7-	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de α - bisabolol supérieure à 1,9 mg et

								glucoside hoger dan 5,6 mg.	d'apigénine-7-glucoside supérieure à 5,6 mg.
Medicago sativa L.	Leguminosae		luzerne, alfalfa	luzerne commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.	
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betché) Cheel	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirtchei	melaleuca, arbre à thé, mélealeuque	bovengrondse delen	parties aériennes	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	
Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajeputhboom	cajeputier	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingsupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	

Melaleuca leucadendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendron (L.) L.			blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca linariifolia Sm.	Myrtaceae			melaëque à feuilles linéaires	blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	niaouli	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina, l'arbre à peau	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melilotus altissimus Thuill.	Leguminosae		goudgele honingklaver, gele honingklaver	grand mélilot	bovengrondse delen	parties aériennes		
Melilotus officinalis (L.) Lam.	Fabaceae		citroengele honingklaver, akkerhoningklaver	mélilot officinal	bloeiende top	sommité fleurie	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

							tijdens de zwangerschap.	
Melissa officinalis L.	Lamiaceae		citroenmelisse	mélisse, mélisse <i>officinale</i>	bovengrondse delen	parties aériennes		
Melittis melissophyllum L.	Lamiaceae		bijenblad	mélitte à feuilles de mélisse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mentha aquatica L.	Lamiaceae		watermunt, aalkruid, bakkruid, boerenbalsem, vlooienkruid	menthe aquatique	hele plant	plante entière		
Mentha arvensis L.	Lamiaceae		aktermunt	menthe des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mentha spicata L.	Lamiaceae		aarmunt, groene munt	menthe en épi, menthe verte, menthe douce	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mentha x piperita L.	Lamiaceae		pepermunt	menthe poivrée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	Mentzelia scabra Kunth			hele plant	plante entière		
Menyanthes trifoliata L.	Menyanthaceae		waterdrieblad	trèfle d'eau	blad	feuille		
Mesembryanthemum crystallinum L.	Aizoaceae	Gasoul crystallinum (L.) Rothm.; Cryophytum crystallinum (L.) N.E.Br.	ijsplantje, ijskruid	ficoïde glaciale	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloïden hoger dan 90 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes de type mesembrine supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être

Monarda punctata L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Morinda citrifolia L.	Rubiaceae		noni, indische moerbei	noni, pomme-chien	puree en concentraat van vrucht, sap	purée et concentré de fruit, jus	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Morinda officinalis F.C. How	Rubiaceae				hele plant	plante entière		
Moringa oleifera Lam.	Moringaceae		moringa	moringa	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 500 mg de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer aux enfants de moins de 18 ans.

Morus alba L.	Moraceae			witte moerbeï	mûrier blanc	vrucht, blad	fruit, feuille	jonger dan 18 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Morus nigra L.	Moraceae			zwarte moerbeï	mûrier noir	knop, steel, schors, vrucht, blad	bourgeon, tige, écorce, fruit, feuille		
Murraya koenigii (L.) Spreng.	Rutaceae			kerrieboom	arbre à curry, calou pilé, murraya	schors, blad, wortel van de volwassen struik	écorce, feuille, racine d'un buisson adulte		
Musa x paradisiaca L. (pro sp.)	Musaceae	Musa x sapientum L.		banana	bananier	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	Psidium dubium H.B.K.		camu camu, rumbes	camu camu, caçari, camo	vrucht	fruit		
Myrica cerifera L.	Myricaceae				arbre à suif, appelé citier, arbre à cire	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

							gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Myrica gale</i> L.	Myricaceae		wilde gage, was gage	piment royal, myrte des marais, bois-sent-bon, myrique baumier	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicaceae		nootmuskatoen	muscadier	foelie, zaad	macis, graine		
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>balsamum</i> (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	baumier de tolu	schors van de stam	écorce du tronc		
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae		mirt	myrte	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.	jatamansi, indisch aarborstelgras, narduskruide	jatamansi, nard indien	hele plant	plante entière		
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Brassicaceae		witte waterkers	cresson de fontaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de pulégone supérieure à 3,5 mg.
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, lotus des indes, lotus sacré	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Nepeta cataria L.	Lamiaceae		wild kattenkruid	herbe aux chats	bovengrondse delen	parties aériennes		
Nepeta tenuifolia Benth.	Lamiaceae	Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	chataire japonaise	blad	feuille		
Nephelium lappaceum L.	Sapindaceae		ramboetan	ramboutan, litchi chevelu	vrucht	fruit		
Nigella sativa L.	Ranunculaceae		zwarte komijn	nigelle cultivée, cumin noir	koud geperste olie van het zaad	huile de la graine pressée à froid	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude persing is instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name: kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à haute dose ne convient pas pour la consommation par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.

Ocimum basilicum L.	Lamiaceae		basilicum, baziëkruid	basilic, basilic commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans

							deskundig advies.	avis d'un spécialiste.
Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae	Ocimum sanctum L.	heilige basilicum	basilic sacré	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae		watertorkruid, watervinkel	oenanthe phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique	rijpe vrucht	fruit mûr		
Oenothera biennis L.	Onagraceae		middelste reunisbloem	onagre bisanuelle	zaad	graine		
Olea europaea L.	Oleaceae		olijfboom	olivier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae		olijfboom	olivier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Ononis spinosa L.	Leguminosae	Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"	kattedoorn	bugrane épineuse, arrête-bœuf	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

								isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams	Leguminosae	Ononis arvensis L.	wild zoethout, stalkruid	bugrane des champs	wortel	racine		De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Onopordon acanthium L.	Compositae		wegdistel	chardon aux ânes, onopordon fausse-acanthe	bovengrondse delen	parties aériennes			
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae		japanse slangenbaard	barbe de serpent, muguet du japon	knol	tubercule		De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		opopanax	opopanax, opopanax de chiron	hele plant, gomhars	plante entière, gomme- résine		
Opuntia ficus- indica (L.) Mill.	Cactaceae		vijgcactus	oponce, figuier de barbarie	cladode, bloem, vrucht	cladode, fleur, fruit		
Orchis mascula L.	Orchidaceae		mannetjesorchis	orchis mâle	wortelknol	tubercule		
Origanum compactum Benth.	Lamiaceae		origano	origan	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum dictamnus L.	Lamiaceae		hopmarjolein, kandische majoraan	dictame de crête	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum majorana L.	Lamiaceae	Majorana hortensis Moench.	marjolein, majoraan	marjolaine, amarique	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum vulgare L.	Lamiaceae		wilde marjolein, orego	origan, origan vulgaire, marjolaine sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.	Lamiaceae		javaanse nierthee	thé de java, moustaches de chat	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à

Orthosiphon aristatus var. aristatus	Lamiaceae		kattensnor		moustaches de chat	bovengrondse delen	parties aériennes		5,5 g de feuilles séchées.
Oryza sativa L.	Poaceae		rijst		riz	zaad, wortel	graine, racine		
Oxalis acetosella L.	Oxalidaceae		witte klaverzuring		oselle des bois	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pachira aquatica Aubl.	Malvaceae		watercacao		marce, noisetier de la guyane, noix de malabar, arbre à monnaie	blad, zaad	feuille, graine		
Pachira insignis (SW.) Savigny	Malvaceae					zaad	graine		
Padus avium var. avium	Rosaceae	Prunus padus L.	gewone vogelkers		cerisier à grappes, merisier à grappes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Paeonia lactiflora Pall.	Paeoniaceae	Paeonia albiflora Pall., Paeonia chinensis L. Vilmorin	chinese pioen		pivoine blanche, pivoine commune	bloem, wortel, zaad	fleur, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Paeonia officinalis L.	Paeoniaceae		boerenpioen		pivoine officinale	bloem, wortel	fleur, racine		

<i>Paeonia x suffruticosa</i> Andrews	Paeoniaceae		boompioen	pivoïne en arbre	wortel	racine		
<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmariaceae	<i>Fucus palmatus</i> L., <i>Rhodymenia palmata</i> (L.) Greville	rood lapwier	rhodyménie palmé	thallus	thallus		
<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	Araliaceae		ginseng	ginseng, mandragore coréenne	wortel, blad, bes	racine, feuille, bes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Panax notoginseng</i> (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Panax pseudoginseng</i> Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax quinquefolius L.	Araliaceae		amerikaanse ginseng	ginseng américain	wortel, blad, zaad	racine, feuille, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panicum miliaceum L.	Poaceae		pluimgierst	millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Panzerina lanata (L.) Soják	Leguminosae	Panzeria lanata (L.) Bunge.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae		grote klapproos	grand coquelicot	bloem	fleur		
Parietaria officinalis L.	Urticaceae		groot glaskruid	pariétaire officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

							usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Parthenium hysterophorus L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	Ampelopsis tricuspidata Siebold et Zucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd	vigne-vierge à trois pointes	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupple menten met bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de jeune pousse: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
Passiflora edulis Sims	Passifloraceae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pastinaca sativa L.	Apiaceae		pastinaak	panais	wortel	racine		
Paullinia cupana Kunth	Sapindaceae		guarana	guarana	zaad	graine		
Pedaliium murex L.	Pedaliaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		

Pelargonium graveolens L'Herit	Geraniaceae		rozenpelargonium , rozengeranium	pélargonium à forte odeur	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniaceae	Pelargonium radula (Cav.) L'Hér.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Pelargonium sidoides DC.	Geraniaceae		geranium	pélargonium	hele plant	plante entière		
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	blad, zaad	feuille, graine		
Persea americana Mill.	Lauraceae		avocadoboom	avocatier	blad	feuille		
Persicaria bistorta (L.) Samp.	Polygonaceae	Polygonum bistorta L.	adderwortel, adderkruid	bistorte, renouée bistorte, serpenteaire, feullote	wortelstok	rhizome		
Persicaria maculosa Gray	Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	perzikkruid	renouée persicaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Petiveria alliacea L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruid	herbe aux poules	blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae		tuinpeterselie	persil cultivé	hele plant	plante entière		
Peucedanum ostruthium (L.) W. Koch	Apiaceae		meesterwortel, varkenskerfvel	impératoire, peucedan officinal	hele plant	plante entière		
Peumus boldus Molina	Monimiaceae		boldo	boldo	blad	feuille		
Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae		gewone boon	haricot commun	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		

Phellodendron amurense Rupr.	Rutaceae		kurkboom	phellodendron de l'amour, arbre au liège	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phillyrea latifolia L.	Oleaceae			alavert à larges feuilles	blad	feuille		
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polypodium leucatomos Poir.	blauwvaren		blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Phoenix dactylifera L.	Arecaceae		dadelpalm	palmier dattier, dattier	vruchtvlees	pulpe du fruit		
Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	Aronia melanocarpa (Michaux.) S. Elliott	zwarte appelbes	amélanchier à fruits noirs, aronie à fruits noirs	vrucht	fruit		
Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	Lippia dulcis Trev.	azteeks zoetkruid	l'herbe sucrée des Aztèques	bovengrondse delen	parties aériennes		
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae				bloeiende top	Sommités fleuries	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

							gebruiken tijdens de zwangerschap.	utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus emblica L.	Phyllanthaceae	Emblica officinalis Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, arbre de malacca	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus niruri L.	Phyllanthaceae				hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin	Hapalidiaceae			lithothamne	thallus	thallus		
Physalis alkekengi L.	Solanaceae		lampionplant, jodenkers	coqueret, coqueret alkékenge, lanterne chinoise	rijpe vrucht	fruit mûr		
Physalis peruviana L.	Solanaceae		goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	coqueret du pérou, groseille du cap	rijpe vrucht	fruit mûr		
Picea abies (L.) Karst.	Pinaceae		fijnspar, grote spar	epicéa commun, epicéa, faux sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge	naald, top van de tak	aiguille, bout de branche		

Picramnia antidesma Sw.	Picramniaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als cascarioside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en cascarioside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Pimenta dioica (L.) Merr.	Myrtaceae	Pimenta officinalis Lindl.	piment, jamaicapeper	poivrier de la jamaïque, piment de la jamaïque	bes	baie		
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		west-indische bay-boom, bay-	piment couronné, bois d'inde	blad	feuille		

			rumboom, bay <i>st.thomas</i>					
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae		anijs	anis	zaad	graine		
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Apiaceae		grote bevernel	grand boucage	wortel	racine		
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae		kleine bevernel	petit boucage	hele plant	plante entière		
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	Pinaceae		koreaanse den	pin de corée	naald, oliechars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	Pinaceae				naald, oliechars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus mugo</i> Turra	Pinaceae	<i>Pinus montana</i> Mill.	bergden	pin buissonnant, pin mugho	knop, naald, scheut	bourgeon, aiguille, pousse		
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	<i>Pinus maritima</i> Lam.	zeeden	pin maritime, pin des landes	schors, zaad, blad, knop (kegel)	écorce, graine, feuille, bourgeon (cône)		
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, oliechars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	schors, knop, vrucht, blad, scheut	écorce, bourgeon, fruit, feuille		
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	maticopeper	matico	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		lange peper	poivre long	vrucht	fruit		
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	vrucht, oliechars, olie	fruit, oléorésine, huile		

<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	<i>Lentiscus vulgaris</i> Fourr., <i>Terebinthus lentiscus</i> (L.) Moench	mastiekboom	lentisque, pistachier lentisque	blad, hars, twijg	feuille, résine, brindille		
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Anacardiaceae		terpentijnboom	pistachier térébinthe, térébinthe	vrucht	fruit		
<i>Pistacia vera</i> L.	Anacardiaceae		pistache, pimpernoot	pistachier, pistachier commun, pistachier cultivé, pistachier vrai	vrucht	fruit		
<i>Pisum sativum</i> L.	Leguminosae		erwt	pois	peul, zaad	gousse, graine		
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i> L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium, plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier	zaadhuid, zaad	tégument de graine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantaginaceae		zandweegbree	plantain de sables	zaad	graine		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		smalle weegbree	plantain lancéolé	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae		grote weegbree	plantain à larges feuilles, grand plantain	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae		ruige weegbree	plantain intermédiaire, langue d'agneau	hele plant	plante entière		
<i>Plantago orbignyana</i> Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	<i>Plantago ovata</i> Phil.	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine		

Plantago ovata Forssk.	Plantaginaceae	Plantago ispaghula Roxb. ex Fleming	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
Platanus orientalis L.	Platanaceae		oosterse plataan	platane d'Orient	knop	bourgeon		
Platycodon grandiflorus (Jacquin) A. DC.	Campanulaceae		ballonklokje, chinese klokjesbloem, ballonbloem	platycodon à grandes fleurs	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'usage prolongé peut irriter l'estomac.
Plectranthus barbatus Andrews	Lamiaceae	Coleus barbatus (Andrews) Benth			blad, wortel, knol	feuille, racine, tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Plukenetia volubilis L.	Euphorbiaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel

							voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	Lamiaceae		patchoeli	patchouli	blad	feuille		
Polygala senega L.	Polygalaceae		senegawortel, senecawortel, ratelslangwortel	polygala de virginie, sénéga, laitier, herbe au lait	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala sibirica L.	Polygalaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala tenuifolia Willd.	Polygalaceae		siberische vleugeltjesbloem	polygala de chine	wortel	racine		
Polygala vulgaris L.	Polygalaceae	Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesbloem	polygale commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

							deskundig advies.	
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Liliaceae	Polygonatum officinale All.	welriekende salomonszegel	sceau de salomon odorant	wortelstok	rhizome		
Polygonum aviculare L.	Asparagaceae		varkensgras	renouée des oiseaux, trainasse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Populus alba L.	Salicaceae		witte abeel, zilverpopulier	peuplier blanc, peuplier argenté, abèle	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus balsamifera L.	Salicaceae		balsempopulier	peuplier baumier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus nigra L.	Salicaceae		zwarte populier	peuplier noir	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremula L.	Salicaceae		ratelpopulier	peuplier tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremuloides Michx.	Salicaceae		amerikaanse ratelpopulier	peuplier faux-tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en

							gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Porphyra umbilicalis Kützinger	Bangiaceae		navelwier, purperwier	nori, porphyre	thallus	thallus		
Portulaca oleracea L.	Portulacaceae		postelein	pourpier, pourpier potager	bovengrondse delen	parties aériennes		
Potentilla anserina L.	Rosaceae		zilverschoon	potentille des oies, potentille ansérine	hele plant	plante entière		
Potentilla argentea L.	Rosaceae		viltganzerik	potentille argentée	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Rosaceae		tormentil, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid	tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe	hele plant	plante entière		

				de sainte catherine				
Potentilla reptans L.	Rosaceae		vijfvingerkruid	potentille rampante, quintefeuille	wortelstok	rhizome		
Prangos pabularia Lindl.	Apiaceae		prangos	yugan	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Primula elatior Hill	Primulaceae		slanke sleutelbloem	primevère élevée, primevère des bois	bloem, wortel	fleur, racine		
Primula veris L.	Primulaceae	Primula officinalis (L.) Hill.	gulden sleutelbloem	primevère officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Prunella vulgaris L.	Lamiaceae		gewone brunel	brunelle commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.
Prunus africana (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum africanum Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	mueri, pygeum, prunier d'afrique	schors	écorce		
Prunus armeniaca L.	Rosaceae		abrikoos	abricotier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus avium (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	merisier, cerisier des oiseaux,	vrucht, steel	fruit, péduncule		

Prunus cerasus L.	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	zure kers	cerisier, bigarreautilier, griottier	Fruit (narmelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom	Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule, feuille, écorce, gomme		
Prunus domestica L.	Rosaceae		pruimboom	prunier	schors, knop, bloem, vrucht, blad	écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille		
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Batsch.	amandeiboom	amandier	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bourgeon, bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Prunus persica (L.) Stokes	Rosaceae		perzik	pêcher, pêcher commun	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus serotina Ehrh.	Rosaceae		amerikaanse vogelkers	cerisier tardif	schors, blad	écorce, feuille		
Prunus spinosa L.	Rosaceae		sleedoorn	prunellier, epine noire, prunier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		
Psidium guajava L.	Myrtaceae		gauva	goyavier	schors, vrucht, blad, wortel	écorce, fruit, feuille, racine	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.

<i>Psidium guineense</i> Sw.	Myrtaceae	<i>Psidium araca</i> Raddi	braziliaanse guave	goyavier du brésil	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Pterocarpus erinaceus</i> Poir.	Leguminosae			vène	sap van het hout	jus du bois		
<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae				sap van het hout	jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Pterocarpus marsupium</i> Roxb.	Fabaceae		kinoboom, sandelboom, bastaardteak	kino de malabar	bloem, kernhout, blad, gomhars	fleur, duramen, feuille, gomme-résine		
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Leguminosae	<i>Pterocarpus draco</i> L.			hars	résine		
<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f.	Leguminosae		rode sandelboom	santal rouge	hout	bois		
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	kudzu	kudzu	bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten hoger dan 40 mg. De analyseresultaten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40

								moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Pueraria tuberosa</i> (Willd.) DC.	Leguminosae						bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc componenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Gaertn.	Compositae			heelblaadjes	pulicaria dysenterique	hele plant	plante entière		
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Boraginaceae			gevekt longkruid	pulmonaire officinale	wortel	racine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae			granaatboom	grenadier	bloem, vrucht, zaad	fleur, fruit, graine		

Pyrola rotundifolia L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig wintergroen	pyrole à feuilles rondes	blad	feuille		
Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	Porphyra tenera Kjellman			thallus	thallus		
Pyrus communis L.	Rosaceae		peer	poirier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Quercus alba L.	Fagaceae		amerikaanse witte eik	chêne blanc, chêne blanc d'amérique	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus coccifera L.	Fagaceae		hulsteik	chêne des garrigues, chêne kermès	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus ilex L.	Fagaceae		steeneik	chêne vert, yeuse	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus infectoria G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Fagaceae		wintereik	chêne sessile	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus pubescens Willd.	Fagaceae		donzige eik	chêne pubescent, chêne blanc	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus robur L.	Fagaceae		zomereik	chêne pédonculé	schors, vrucht,	écorce, fruit, noix de		

<i>Quercus serrata</i> subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	<i>Quercus</i> <i>glandulifera</i> Blume	chinese eik	chêne à feuilles de charaïgnier	schors, vrucht, galnoot, blad	galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae		kurkeik	chêne-liège, corcier, surter, suv	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Quillaja</i> <i>saponaria</i> Molina	Quillajaceae	<i>Quillaja</i> <i>smeigmader</i> mos DC.			schors	écorce		
<i>Raphanus</i> <i>raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	<i>Raphanus</i> <i>sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.) J.Kern.	knophertik, wilde radijs	ravenelle, radijs ravenelle, radijs sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae		tuinradijs	radijs cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	<i>Raphia</i> <i>pedunculata</i> P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	amidon de la moelle de la pousse		
<i>Rehmannia</i> <i>glutinosa</i> (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		chinese vingerhoedskruid	digitale de chine, <i>rehmannia</i>	wortel	racine		
<i>Reynoutria</i> <i>multiflora</i> (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	<i>Polygonum</i> <i>multiflorum</i> Thunb., <i>Fallopia</i> <i>multiflora</i> (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	renouée à fleurs multiples	wortel, stengel, zaad	racine, tige, graine		
<i>Rhamnus alpina</i> L.	Rhamnaceae		alpenwegedoorn	nerprun des alpes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides

							(uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhamnus cathartica L.	Rhamnaceae		wegedoorn	nerprun purgatif	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline

							analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum australe D. Don	Polygonaceae	Rheum emodii Wall. ex Meisn.			blad, wortelstok	feuille, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. Het gehalte aan rhaponticosiden moet bepaald worden. De analyseresultaten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. La teneur en rhaponticosides doit être déterminée. Les

							moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae		Tuinrabarber	rhubarbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

							volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum officinale Baill.	Polygonaceae		chinese rabarber	rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de

							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum palmatum L.	Polygonaceae		chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation

							deskundig advies.	prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhabarbarum L.	Polygonaceae	Rheum undulatum L.	rabarber	rhubarbe des jardins	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhaponticum L.	Polygonaceae				wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée

							niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéïne) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae		rozewortel	orpin rose	wortel	racine		
Ribes nigrum L.	Grossulariaceae		zwarte aalbes	groseillier noir, cassis, cassissier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Ribes rubrum L.	Grossulariaceae		aalbes, trosbes	groseillier à grappes	vrucht, blad	fruit, feuille		

Ribes uva-crispa L.	Grossulariaceae		kruisbes	groszeilier épineux, groszeilier à maquereau	vrucht, blad	fruit, feuille		
Robinia pseudoacacia L.	Leguminosae		gewone robinia, valse acacia	robinier faux- acacia	gekookte bloem, gekookte zaad	fleur cuite, graine cuite		
Rocella phycopsis Ach.	Rocellaceae	Rocella tinctoria DC.			thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	rosier des chiens, églantier commun	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa x centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos, provenceroos	rosier cent- feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feuille		
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	rosier de france, rosier de provins	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskusroos	rosier musqué	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		églantier	rosier rouillé, rosier rubigineux, rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille		
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f.	damastroos	rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille		

		trigintipetala Dieck						
Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae		rozemarijn	romarin	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia l.	rubiacae	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lucidine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.
Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	ronce bleue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	ronce commune, ronce des buissons, murier sauvage	hele plant	plante entière		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	framboisier commun, framboisier	blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	feuille, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonaceae		veldzuring	oseille sauvage, oseille des prés, oseille, oseille commune	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux*.

							rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	(exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex acetosella L.	Polygonaceae		schapenzuring	petite oseille	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être

							producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex alpinus L.	Polygonaceae		alpenzuring	oseille des alpes	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

							toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluwenzuring	patience agglomérée	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas

							Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex crispus L.	Polygonaceae		krulzuring	patience crépue, churelle	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex longifolius DC.	Polygonaceae				hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex obtusifolius L.	Polygonaceae		ridderzuring	patience à feuilles obtuses, patience sauvage, rumex à feuilles obtuses	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex patientia L.	Polygonaceae		spinaziezuring	patience des moines, oseille épinard	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet roedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex sanguineus L.	Polygonaceae		bloedzuring		hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae						stekelige muizendoorn	fragon, petit houx	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ruscus hypoglossum L.	Asparagaceae								cladode, wortelstok	cladode, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae								bovengrondse delen	parties aériennes				
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druhl & G.W.Saunders	Laminariaceae						suikervier	laminaria sucrée, boudrier de neptune	thallus	thallus				
							Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.							

Saccharum officinarum L.	Poaceae		suikerriet	canne à sucre	tak, sap	branche, jus		
Salix alba L.	Salicaceae		schietwilg, knotwilg	saule blanc	schors, knop, bloem, blad	écorce, bourgeon, fleur, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix caprea L.	Salicaceae		boswilg	saule marsault, saule des chèvres, marsaule, marseau	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix fragilis L.	Salicaceae		kraakwilg	saule, fragile, saule cassant	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et

Salix pentandra L.	Salicaceae		laurierwilg	saule laurier, saule à cinq étamines	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix purpurea L.	Salicaceae		bittere wilg	osier rouge, saule pourpre	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salvia hispanica L.	Lamiaceae		chia	chia	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als nouvel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Salvia miltiorrhiza Bunge	Lamiaceae		rode salie	sauge de chine	blad, wortel	feuille, racine		
Salvia officinalis L.	Lamiaceae		echte salie	sauge officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams	Lamiaceae	Salvia lavandulifoli- a Vahl	lavendelsalie	sauge à feuilles de lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
Salvia pratensis L.	Lamiaceae		veldsalie, weidesalie	sauge commune, sauge des prés	bovengrondse delen	parties aériennes		

Salvia sclarea L.	Lamiaceae		scharlei	sauge sclarée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sambucus nigra L.	Adoxaceae		gewone vlier	sureau noir, sureau commun	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Sanguisorba minor Scop.	Rosaceae		kleine pimpernel	petite pimprenelle	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sanguisorba officinalis L.	Rosaceae		grote pimpernel	sanguisorbe officinale, grande pimprenelle	hele plant	plante entière		
Sanicula elata Buch.-Ham. ex D. Don	Apiaceae	Sanicula europaea L.	heelkruid	sanicle, sanicle d'europe	blad, wortel	feuille, racine		
Santolina chamaecyparissus L.	Asteraceae		heiligenbloem	santale petit cyprès	bloeiende top, blad, zaad	sommité fleurie, feuille, graine		
Saponaria officinalis L.	Caryophyllaceae		zeepkruid	saponaire officinale	hele plant	plante entière		
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk	Apiaceae	Siler divaricatum (Turcz.) Benth. & Hook. f.		racine de silère	wortel	racine		
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach	Rosaceae	Poterium spinosum L.		racine de silère	wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell	Sargassaceae	Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	hijiki, hiziki	hijiki, hiziki	thallus	thallus		
Sarracenia purpurea L.	Sarraceniaceae		paarse trompetbekerplant	sarracénie pourpre	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Satureja hortensis L.	Lamiaceae		bonekruid	sarriette commune, sarriette, sarriette des jardins	bloeiende top, zaad	sommité fleurie, graine		
Satureja montana L.	Lamiaceae		winterbonenkruid, bergbonekruid, bergsteentijm	sarriette des montagnes, sarriette vivace	bovengrondse delen	parties aériennes		
Satureja thymbra L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Saussurea costus (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	Saussurea lappa (Decne.) Sch. Bip.	costus	costus	wortel	racine		
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	Schisandraceae		schisandra, wu wei zu	schisandra de chine	decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	décoction de branche, jeune feuille cuite, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

									gebruik van anticoagulantia.	concomitant d'anticoagulants.
Schizochytrium microalgae	Thraustochytriales							olie	huile	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Scorzonera hispanica L.	Compositae							wortel	racine	
Scrophularia ningpoensis Helmsl.	Scrophulariaceae							wortel	racine	
Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae							blad, wortel	feuille, racine	
Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae							hele plant	plante entière	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo-clérodanes. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.

Secale cereale L.	Poaceae		rogge	seigle	hele plant	plante entière		
Sedum acre L.	Crassulaceae		muurpeper	orpin âcre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sedum album L.	Crassulaceae		wit vetkruid	orpin blanc, sédum blanc	blad	feuille		
Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rhadiole rose, orpin rose	wortel	racine		
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.	koningin der nacht	reine de la nuit	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden narcissine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en narcissine.
Sempervivum tectorum L.	Crassulaceae		gewone huislook	joubarbe des toits, barbe de jupiter	bovengrondse delen	parties aériennes		
Senna alexandrina Mill.	Leguminosae	Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia	alexandrijnse senna	séné d'alexandrie	blad, peul	feuille, gousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

		(Vahl) Batka.					bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna italica Mill.	Leguminosae	Cassia italica (Mill.) F.W.Andrew s			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas

							arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia obtusifolia L.			hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosae			faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâtard, casse- puante	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae				blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae		mammoetboom	séquoia géant	jonge bebladerde scheuten	jeunes pousses feuillées	Enkel geglycerineerde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstemt met maximum 41 mg	Seuls sont autorisés les macéras froids glycinés pour lesquels la dose journalière recommandée correspond à maximum 41 mg d'équivalent plante sèche.

							equivalent droge plant.	
<i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small	Arecaceae	<i>Serenoa serrulata</i> (Michx.) G. Nicholson ; <i>Serenoa serrulata</i> (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks.; <i>Sabal serrulata</i> (Michx.) Schult.f.	zaagpalm, zaagpalmetto	sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord	vrucht	fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.
<i>Sesamum indicum</i> L.	Pedaliaceae	<i>Sesamum orientale</i> L.	sesam	sésame	zaad	graine		
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Apiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sideritis syriaca</i> L.	Lamiaceae		bergthee	Thé Grec des Montagnes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	<i>Sigesbeckia serrata</i> DC.		herbe grasse, herbe divine, herbe saint-paul	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Silaum silaus</i> (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae		weidekervel	siläus des prés	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	chardon-marie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	graine sans huile	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les

							gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de zwangerschap.	enfants et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.
<i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	gewone raket	sisymbre officinal, herbe aux chantes, vélar	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve steroïde glycoside bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en glycosides stéroïdes cardiotoniques.
<i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schltl. et Cham.			wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae		struikwinde, steke nde winde	salsepareille d'europe	wortelstok, wortel, wortelscheut	rhizome, racine, pousse de racine		
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		chinawortel	squine	hele plant	plante entière		
<i>Smilax cordifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae	<i>Smilax tonduzii</i> Apt	echte sarsaparilla	salsepareille	wortel	racine		
<i>Smilax purhampuy</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax febrifuga</i> Kunth	ecuadorianse sarsaparilla	smilax febrifuga kunth	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax regelii</i> Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla,	salsepareille, salsepareille du honduras	wortelstok, wortel	rhizome, racine		

Stellaria media (L.) Vill.	Caryophyllaceae		vogelmuur	stellaire intermédiaire, morgeline	bovengrondse delen	parties aériennes		
Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittich	Asteraceae	Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin		rhapontique des alpes	wortel	racine		
Styphnolobium japonicum (L.) Schott	Leguminosae	Sophora japonica L.	honingboom	sophora du japon	gekookt jong blad, bloem, bloemknop, decoct van het zaad, decoct van de stengel	jeune feuille cuite, fleur, bouton floral décoction de la graine, décoction de la tige	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Symplocos racemosa Roxb.	Symplocaceae				bast	liber		
Syringa vulgaris L.	Oleaceae		sering	lilas commun, lilas français	bladknop	bourgeon de feuille		
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry	Myrtaceae	Caryophyllus aromaticus L., Eugenia caryophyllata Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	kruidnagelboom	girofle, giroflier, géroflier	bloemknop	bourgeon de fleur		
Syzygium cumini (L.) Skeels	Myrtaceae		jambolan	jamblon, jamelonier	schors, vrucht, blad, zaad	écorce, fruit, feuille, graine		
Syzygium jambos (L.) Alston	Myrtaceae		rozenappel	jamrosat, jambrosade, jambosier, jamrose, pomme rose	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure

Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		bibhitaki, bastaard myrobalaan	bibhitaki	vrucht	fruit		
Terminalia chebula Retz.	Combretaceae		zwarte myrobalaan	badamier chebule, myrobalaan chebule	vrucht	fruit		
Thalictrum flavum L.	Ranunculaceae		poelruit	pigamon	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloides d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Theobroma cacao L.	Malvaceae		cacaoboorn	cacaoyer	zaad	graine		
Thlaspi arvense L.	Brassicaceae		witte krodde, boerenkers	tabouret des champs, monnoyère	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

								waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Thymus satureioides Coss.	Lamiaceae			satureja thym	thym saturéioïde	bovengrondse delen	parties aériennes		
Thymus serpyllum L.	Lamiaceae			wilde thym, veldthym, citroenthy	serpolet à feuilles étroites, piolet, thym sauvage, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Thymus vulgaris L.	Lamiaceae			echte thym, hooithym, roomse kwendel, tijmoes	thym commun, thym vrai, pouilleux, frigouille	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant. De etikettering moet de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 4 g de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les

							volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Thymus zygis L.	Lamiaceae		spaanse tijm, rode tijm	thym d'espagne, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes		
Tilia americana L.	Malvaceae		amerikaanse linde	tilleul d'amérique	bovengrondse delen	parties aériennes		
Tilia cordata Mill.	Malvaceae		winterlinde, kleinbladige linde	tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul à feuilles en cœur	hele plant	plante entière		
Tilia platyphyllos Scop.	Malvaceae		zomerlinde, grootbladige linde	tilleul à larges feuilles	hele plant	plante entière		
Tilia tomentosa Moench	Malvaceae	Tilia argentea DC.	zilverlinde	tilleul argenté	hele plant	plante entière		
Tilia x europaea L.	Malvaceae	Tilia x vulgaris B. Heyne	hollandse linde	tilleul de hollande, tilleul commun	schors, bloem, blad, zaad	écorce, fleur, feuille, graine		
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.	Menispermaceae	Tinospora cordifolia (Willd.) Miers			wortel, stengel, blad	racine, tige, feuille		
Trachyspermum ammi (L.) Sprague	Apiaceae		ajowan	ajowan	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Tragopogon porrifolius L.	Compositae		paarse morgenster, boksbaard	salsifis cultivé	wortel	racine		
Tribulus terrestris L.	Zygophyllaceae		tribulus	croix-de-malte, tribule terrestre	gekookte plantendelen van de hele plant	parties de plantes cuites de la plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de saponines supérieure à 15 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension ou le diabète. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans.
Trichilia catigua A. Juss.	Meliaceae		catuaba	catuaba	schors	écorce	Een gedetailleerde botanische identificatie is vereist. Analyse	Une identification botanique détaillée est requis.

Trichosanthes kirilowii Maxim.	Cucurbitaceae				chinese komkommer	concombre chinois	vrucht (pericarp en zaad)	fruit (péricarpe et graine)	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat.	moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en trichosanthine.
Tridax procumbens L.	Compositae						bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Trifolium arvense L.	Leguminosae				hazepootje	pied-de-lievre, trèfle des champs, trèfle	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside du composant principal) supérieure à 40	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40

Trifolium campestre Schreb.	Leguminosae						liggende klaver	trèfle des champs		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium pratense L.	Leguminosae						rode klaver	trèfle des prés, trèfle rouge, triolet		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse

Trifolium repens L.	Leguminosae			witte klaver	trèfle rampant, trèfle blanc, coucou	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	doivent être disponibles pour chaque lot de produits. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trigonella caerulea (L.) Ser.	Leguminosae			zevengetijdeklave r	trigonelle bleue	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Trigonella foenum-graecum L.	Leguminosae			fenegriek	fenugrec	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

<i>Trillium erectum</i> L.	Melanthiaceae		drieblad, boslelie	trille rouge, trille dressé	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Poaceae	<i>Triticum vulgare</i> Vill. ; <i>Triticum sativum</i> Lam.	gewone tarwe	blé commun, froment	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Triticum dicoccon</i> (Schränk.) Schübl.	Poaceae		emmertarwe, emmer, tweekoren	amidonnier	vrucht	fruit		
<i>Triticum durum</i> Desf.	Poaceae	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. durum (Desf.) Husnot	harde tarwe	froment dur	scheut, zaad	pousse, graine		
<i>Triticum spelta</i> L.	Poaceae		spelt	épeautre	scheut, zaad	pousse, graine		
<i>Triticum turgidum</i> L.	Poaceae		engelse tarwe	blé barbu, gros blé	scheut, zaad	pousse, graine		
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae		oost-indische kers	grande capucine	bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analysesresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Tropaeolum minus L.	Tropaeolaceae				bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour

							of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Pinaceae		oostelijke, canadese hemlockspar	pruche du canada, pruche de l'est	blad, hars	feuille, résine		
<i>Turnera diffusa</i> Wild. ex Schult.	Passifloraceae		damiaanblad, damiana	feuilles de damiana, turnéra	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> L.; <i>Ulmus scabra</i> Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop	écorce, bourgeon		
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		siberische iep	orme de sibérie	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	Ulmaceae	<i>Ulmus fulva</i> Michx.	rode iep	orme rouge	schors	écorce		
<i>Ulva lactuca</i> L.	Ulvaceae		zeesla	laitue de mer	thallus	thallus		
<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou gambir, arbre catechu	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	<i>Nauclea rhynchophyl la</i> Miq.			haak	crochet		

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schant.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	griffe de chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine		
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar	Alariaceae	Alaria pinnatifida Harvey	wakame	wakamé	thallus	thallus		
Urtica dioica L.	Urticaceae		grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupple menten met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Urtica urens L.	Urticaceae		kleine brandnetel	ortie brûlante, petite ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupple menten met bereidingen van	Pour les compléments alimentaires avec des

							de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, barbe de saint-antoine, barbe de jupiter	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Usnea longissima Ach.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, mousse d'espagne	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière

							hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Usnea plicata Wiggers	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Vaccinium myrtilloïdes Michx.	Ericaceae	Vaccinium angustifolium var. myrtilloides (Michx.) House		airelle fausse-myrtille, bleuet, bleuet sauvage	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium corymbosum L.	Ericaceae		blauwe bes	myrtille arbustive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuet géant, corymbelle	vrucht, blad	fruit, feuille		

Vaccinium macrocarpon Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry	canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits	bes	baie		
Vaccinium myrtillus L.	Ericaceae		blauwe bosbes	myrtille commune, myrtillier, baies de myrtille	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium oxycoccos L.	Ericaceae	Oxycoccus palustris Pers.	kleine veenbes	canneberge des marais, airelle canneberge, canneberge ou atocas	vrucht	fruit		
Vaccinium uliginosum L.	Ericaceae		rijsbes	myrtille des marais	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium vitis-idaea L.	Ericaceae		rode bosbes	airelle, airelle vigne d'ida, airelle rouge	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 6,8 g de feuille séchée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Valeriana jatamansi Jones	Valerianaceae	Valeriana wallichii DC.	indische valeriaan	valériane d'inde	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

								ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.	
Valeriana officinalis L.	Caprifoliaceae			echte valeriaan	valériane officinale, valériane des collines, valériane à petites feuilles	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding mag geen valépotriaten bevatten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	Valeriana locusta L.	veldsla, korensla, ezelsoor	mâche, blanchette, bourssette, clairrette, raiponce, oreillette, salade de blé	blad	feuille			
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		vanille-orchidee	vanille	vrucht, oliehars	fruit, oléorésine			

Verbasum densiflorum Bertol.	Scrophulariaceae		stalkaars	bouillon blanc à grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène	bovengrondse delen	parties aériennes		
Verbasum phlomoides L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	molène faux-phlomis	bloem	fleur		
Verbasum thapsus L.	Scrophulariaceae		koningskaars	bouillon blanc à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Verbena officinalis L.	Verbenaceae		ijzerhard	verveine sauvage, verveine officinale	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Veronica anagallis-aquatica L.	Plantaginaceae		blauwe waterereprijs	véronique mouron d'eau, mouron aquatique	hele plant	plante entière		
Veronica beccabunga L.	Plantaginaceae		beekpunge	véronique des ruisseaux, cresson de cheval, salade de chouette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Veronica chamaedrys L.	Plantaginaceae		gewone ereprijs, gamander-ereprijs	véronique petite, chène, fausse germandrée	hele plant	plante entière		
Veronica officinalis L.	Plantaginaceae		mannetjesereprijs	véronique officinale, thé d'Europe	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viburnum lantana L.	Adoxaceae		vollige sneeuwbal	viorne mancienne, viorne lantane, mansienne	bovengrondse delen	parties aériennes		

Viburnum opulus L.	Adoxaceae		gelderse roos	viorne obier, boule-de-neige	bovengrondse delen	parties aériennes		
Vicia faba L.	Leguminosae		tuinboon, labboon	fèves, féverolles	gekookt zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	Phaseolus chrysanthos Savi	adzukiboon	haricot azuki	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		
Viola calcarata L.	Violaceae		langsporig viooltje	pensée des alpes	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola odorata L.	Violaceae		maarts viooltje	violette odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola palustris L.	Violaceae		moerasviooltje	violette des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola tricolor L.	Violaceae		driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore des jardins, pensée tricolore	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viscum album L.	Santalaceae		maretak	gui	tak, blad	branche, feuille		
Vitex agnus-castus L.	Lamiaceae		monnikkenpeper, kuisboom	gatillier, agneau-chaste	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité

							96 mg gedroogde vrucht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	équivalente à 96 mg de fruit séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Vitex trifolia L.	Lamiaceae				vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Vitis vinifera L.	Vitis Vitaceae		druif, wijnstok, wijngaardstok	vigne cultivée, vigne vinifère	vrucht, bladknop, blad, zaad	fruit, bourgeon de feuille, feuille, graine		
Withania somnifera (L.) Dunal	Solanaceae		ashwagandha, indise ginseng	ashwagandha, ginseng indien	hele plant	plante entière		
Xeranthemum annuum L.	Compositae		papierbloem	immortelle	bloem	fleur		
Yucca filamentosa L.	Asapragaceae		palmlelie	yucca filamenteux	bovengrondse delen	parties aériennes		
Yucca schidigera Roez. ex Ortgies	Asapragaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Zea mays L.	Poaceae		maïs	maïs	bloem, vrucht, haarwortels	fleur, fruit, racines de		

					van gekiemde zaad	graine germée		
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberaceae		gember	gingembre, amome des indes	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à 1 g de rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6

								ans n'est pas autorisée.
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae		jujubeboom, chinoise dadel	jujubier, dattier chinois	bovengrondse delen	parties aériennes		

* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoïdes, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.

* Het "totaal" gehalte aan anthranoïden dient berekend te worden via bepaling van de gehalten in de afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te worden. Bij mengsels van verschillende plantensoorten het totaal gehalte te beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij enkelvoudig gebruik.

Vu pour être annexé à notre arrêté du relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

Van Koningswege:

De Minister van Volksgezondheid,



Frank VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,

De Minister van Landbouw,

David CLARINVAL

