

Koninkrijk België

Royaume de Belgique

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, laatst gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (EU) 2015/2283 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 2;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 14 februari 2023;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 14 février 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023 ;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 29 juli 2022 met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Vu la communication à la Commission européenne, le 29 juillet 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Gelet op advies ... van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen, gegeven op 28 juni 2022;

Overwegende dat planten, die al dan niet in de lijsten van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, onder de toepassing vallen van verordening (EU) nr. 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en de Minister van Volksgezondheid,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Artikel 1. In artikel 6, §1, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) in de bepaling onder 7° worden de woorden “die in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit zijn aangegeven,” opgeheven;
- b) in de bepaling onder 8° worden de woorden “die in lijst 2 en 3 van de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven,” opgeheven.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. De voedingsmiddelen die niet voldoen aan de voorwaarden vervat in dit besluit maar wel aan de voorwaarden zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit, kunnen in de handel worden gebracht tot twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Vu l'avis ... du Conseil d'Etat, donné le ..., en application de l'article 84, §1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission d'Avis des Préparations de Plantes, donné le 28 juin 2022 ;

Considérant que les plantes, mentionnées ou non dans les listes de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Santé publique,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Article 1^{er}. Dans l'article 6, §1 de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, les modifications suivantes sont apportées :

- a) dans le 7° les mots « qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, » sont abrogés ;
- b) dans le 8° les mots « qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, » sont abrogés.

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux conditions visées au présent arrêté mais aux conditions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. De minister bevoegd voor Landbouw en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

,

, le

Van Koningswege:

Par le Roi:

De Minister van Landbouw,


Le Ministre de l'Agriculture,



David CLARINVAL

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,



Frank VANDENBROUCKE

BIJLAGE bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

Lijst 1 : Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden

ANNEXE à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

ANNEXE à l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

Liste 1 : Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires

Wetenschappelijke naam / Nom scientifique	Familie / Famille	Synoniemen / Synonymes	Nederlandse naam / nom Néerlandais	Fransse naam / nom Français	Beperkingen en afwijkingsvoorwaarden	Limites et conditions de dérogation
<i>Abrus precatorius</i> L.	Leguminosae		weesboontje	réglisse d'amérique		
<i>Aconitum</i> spp.	Ranunculaceae		monnikskap	aconit		
<i>Actaea spicata</i> L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	actée en épi		
<i>Adenium</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Adonis</i> spp.	Ranunculaceae		voorjaarsadonis	adonis du printemps		
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Apiaceae		hondspeterselle	petite ciguë		
<i>Agapanthus</i> spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	agapanthe		
<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae		bolderik	nielle des blés		
<i>Aletris farinosa</i> L.	Nartheciaceae					
<i>Aleurites</i> spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulier		
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	graine de lumbang, kukui, kemiri	Een afwijking voor het gebruik van niet geraffineerde olie kan worden gevraagd door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen	Une dérogation pour l'utilisation de l'huile non raffinée peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée

						dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat phorbolesters en/of eleostearinezuur bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een innname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze phorbolesters en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor eleostearinezuur.	du produit fini contenant des esters de phorbol et/ou de l'acide éléostéarique, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces esters de phorbol scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de l'acide éléostéarique scientifiquement fondée.
Alkanna spp.	Boraginaceae				alkanna	orcanette	
Amaryllis spp.	Amaryllidaceae				amaryllis	amaryllis	
Ammi majus L.	Apiaceae				groot akkerscherm	grand ammi	
Anacyclus officinarum Hayne	Anacyclus				duitse bertram	pyréthre d'Allemagne	
Anacyclus pyrethrum (L.) Link.	Anacyclus				roomse bertram	pyréthre d'Afrique	
Anadenanthera spp.	Leguminosae						
Anagallis arvensis L.	Primulaceae				guichelheil	mouzon rouge des champs	
Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn.	Menispermaceae				kokkelkorrelstruik	coque du levant	
Anchusa spp.	Boraginaceae				ossentong	buglosse	
Andromeda spp.	Ericaceae				lavendelhei	andromède	
Anemone spp.	Ranunculaceae				anemoon	anémone	
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock.) Engl.				Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias, Cusparia trifoliata (Willd.) Engl.	angusturaboorn	angusture vraie	

(zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)							
Baptisia spp.	Leguminosae						
Baptisia tinctoria (L.) R.Br.	Leguminosae	wilde indigo, verflupine	indigo sauvage, lupin indigo			Een afwijking voor het gebruik van de wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor planten-bereidingen indien het dossier middels analyse aan toont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat cytisine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor cytisine.	Une dérogation pour l'utilisation de la racine peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant de la cytisine, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de cytisine scientifiquement fondée.
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	luipaardbloem	fleur léopard				
Borago spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Boraginaceae	incl. bernagie	incl. bourrache			Het gebruik van kleine hoeveelheden bloemen van <i>Borago officinalis</i> L. in culinaire bereidingen is toegelaten.	L'utilisation de petites quantités de fleurs de <i>Borago officinalis</i> L. dans les préparations culinaires est autorisée.
Brachyglottis spp.	Compositae						
Brayera anthelmintica Kunth	Rosaceae	kosoboom	kouso				
Brugmansia spp.	Solanaceae						
Brunfelsia spp.	Solanaceae						
Bryonia spp.	Cucurbitaceae	o.a. heggerank	bryone				
Buxus sempervirens L.	Buxaceae	palmboomje	buis commun				
Caladium spp.	Araceae		pédiveau				

<i>Calea zacatechichi</i> Schltdl	Compositae			droomkruid	l'herbe rêveuse		
<i>Calla palustris</i> L.	Araceae			slangewortel	calla des marais		
<i>Caltha palustris</i> L.	Ranunculaceae			dotterbloem	souci d'eau, populage des marais		
<i>Canarium indicum</i> L.	Burseraceae			nangainoten	noix de nagaille		
<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabaceae			hennep	chanvre	Het gebruik van hennepzaden en daarvan afgeleide producten kan worden toegestaan indien het voedingsmiddel voldoet aan de bepalingen van sectie 2.6 (delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC)-equivalenten) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1831/2006.	L'utilisation des graines de chanvre et des produits dérivés peut être autorisée si la denrée alimentaire est conforme aux dispositions de la section 2.6 (équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ^9 -THC)) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1831/2006.
<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Leguminosae			erwtenstruik	arbre aux pois		
<i>Carlina</i> spp. (zie ook lijst 3 / voir aussi liste 3)	Compositae						
<i>Caryota</i> spp.	Arecaceae				e.a. palmier céleri		
<i>Catha edulis</i> (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae			qat	khat		
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae			roze maagdenpalm	pervenche de Madagascar		

<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.	Berberidaceae		blauwe zilverkaars	blue cohosh		
<i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L.Andersson	Rubiaceae	<i>Cephaelis acuminata</i> Karst., <i>Uragoga granatensis</i> Baill., <i>Uragoga ipecacuanha</i> (Brot.) Baill., <i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brot.) Tussac	braakwortel	racine d'ipeca, ipéca du Brésil		
<i>Erysimum x cheiri</i> (L.) Crantz	Brassicaceae	<i>Cheiranthus x cheiri</i> L.	muurbloem	giroflée des murailles, vélard		
<i>Cestrum</i> spp.	Solanaceae					
<i>Ceterach officinarum</i> DC.	Aspleniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'une analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du ptaquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de ptaquiloside scientifiquement fondée.
<i>Chamaelirium luteum</i> (L.) A. Gray	Melanthiaceae		helonias	fausse unicomne		

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	welriekende ganzevoet	Chenopode fausse-ambroise, thé-du-mexique		
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat praquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wettenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor praquiloside.	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du praquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de praquiloside scientifiquement fondée.
Cicuta virosa L.	Apiaceae		waterscheerling	ciguë vireuse, ciguë aquatique		
Cineraria spp.	Compositae			cinéraire		
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	Cucumis colocynthis L.	kolokwint	colocointe officinale		
Clivia miniata (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae		clivia, sint-Jozefsbloem	lis de saint Joseph		
Clusia rosea Jacq.	Clusiaceae					
Cnidioscolus spp.	Euphorbiaceae					
Colchicum autumnale L.	Colchicaceae		herfsttijloos	colchique d'automne		
Colutea arborescens L.	Leguminosae		europese blazenstruik	baguenaudier commun, arbre à vessies		
Comandra spp.	Santalaceae					
Conium maculatum L.	Apiaceae		gevelekte scheerling	grande ciguë		

Convallaria majalis L.	Asparagaceae		belietje-van-dalen, meiklokje	muguet		
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae		akkerwinde	liseron des champs		
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae		purgeerwinde	scammonée		
Coriaria myrtifolia L.	Coriariaceae		looiersstruik	redoul		
Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl.	Coriariaceae					
Corydalis spp.	Papaveraceae		helmbloem, o.a. holwortel	e.a. corydale creuse		
Corydalis solida (L.) Clairv.	Papaveraceae	Corydalis bulbosa (L.) DC.	vingerhelmbloem	corydale solide, corydale à tubercule plein	Een afwijking voor het gebruik van de wortelstok kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een innames hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	Une dérogation pour l'utilisation du rhizome peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Corynanthe spp.	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Cotoneaster spp.	Rosaceae		dvergmisspel	cotonéaster		
Crinum asiaticum L.	Amaryllidaceae		lilie	crinum d'asie		
Crotalaria spp.	Leguminosae					
Croton spp.	Euphorbiaceae					

Cryptostegia spp.	Apocynaceae						
Cycas spp.	Cycadaceae			cycaspalm, varenpalm	cycas		
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Poaceae			handjesgras	chiendent dactyle		
Cynoglossum spp.	Boraginaceae			bondstong	cynoglosse		
Cypripedium calceolus L.	Orchidaceae			vrouwenschoentje	sabot de vénus		
Cytisus spp.	Leguminosae						
Dalechampia scandens Jacq.	Euphorbiaceae				liane ortie		
Daphne spp.	Thymelaeaceae						
Datura spp.	Solanaceae						
Delphinium spp.	Ranunculaceae			riderspoor	staphisaigre, dauphinelle		
Derris spp.	Leguminosae						
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara		Dicentra spectabilis (L.) Lem.		Gebroken hartje	cœur de marie, cœur de jeanette		
Dichondra repens J.R. Forst. Et G. Forst.	Convolvulaceae				dichondra rampant		
Dictamnus albus L.	Rutaceae			vuurwetplant, essenkruid	dictame blanc, fraxinelle		
Dieffenbachia spp.	Araceae			dieffenbachia	dieffenbachia		
Digitalis spp.	Plantaginaceae			vingerhoedskruid	digitale		
Tamus communis L.	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin		spekwortel	tamier commun		
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae			tonkabonen boom	fève de tonka		
Dirca palustris L.	Thymelaeaceae				dirca des marais		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae			manneijesvaren	fougère mâle		
Duboisia spp.	Solanaceae						
Durio zibethinus L.	Malvaceae			doerian	durian, durion		
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae			springkomkommer	concombre d'âne, momordique		

						van het eindproduct dat galegine en/of peganine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een innname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor galegine en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor peganine.	de la galegine et/ou de la peganine, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de galegine scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de peganine scientifiquement fondée.
Garcinia hanburyi Hook. f.	Clusiaceae						
Geissospermum spp.	Apocynaceae						
Gelsemium spp.	Gelsemiaceae					jasmin jaune	
Genista tinctoria L.	Leguminosae				verfbrem	genêt des teinturiers	
Glechoma hederacea L.	Lamiaceae				bondsdrif	lierre terrestre	
Globularia alypum L.	Plantaginaceae				drietandkogelbloem	globulaire turbitt	
Globularia vulgaris L.	Plantaginaceae				gewone kogelbloem	globulaire commune	
Gloriosa superba L.	Colchicaceae				prachtlelie		
Gratiola officinalis L.	Plantaginaceae				genadekruid	gratiolle	
Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.	Leguminosae			Bandeiraea simplicifolia (DC.) Benth.	griffonia	griffonia	
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.	Hypericaceae			Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	guttier du gabon	
Heimia spp.	Lythraceae						
Heliotropium spp.	Boraginaceae				heliotroop, zonnewende	héliotrope	
Helleborus spp.	Ranunculaceae				nieskruid, o.a. kerstroos	hellebore, e.a. rose de Noël	
Hepatica nobilis Mill.	Ranunculaceae				leverbloempje	anémone hépatique	

<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier et Levier	Apiaceae			reuzenberenklauw	berce de caucase		
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae			manchineel	mancenillier		
<i>Homalomena</i> spp.	Araceae						
<i>Hura crepitans</i> L.	Euphorbiaceae			zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc		
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Asparagaceae			hyacinth	jacinthe d'orient		
<i>Hyoxyanthus</i> spp.	Solanaceae						
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae			hulst	houx		
<i>Illicium anisatum</i> L.	Schisandraceae		<i>Illicium religiosum</i> Siebold et Zucc.	japanse steranijs	anis étoilé du japon		
<i>Ipomoea</i> spp. (zie ook lijst 3/ voir aussi liste 3))	Convolvulaceae			pronkwinde	ipomée		
<i>Iris</i> spp.	Iridaceae			o. a. lis	iris		
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae			purgeemoot	médiciner, pourghère		
<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae			zwarte walnoot	noyer noir		
<i>Juniperus sabina</i> L.	Cupressaceae			sabijnse jeneverbes	genévrier sabine		
<i>Kalmia latifolia</i> L.	Ericaceae			lepelboom	laurier de montagne		
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Leguminosae		<i>Cytisus laburnum</i> L.	gewone goudenregen	cytise faux ébénier		
<i>Lactuca virosa</i> L.	Compositae			gifsla	laitue vireuse		
<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae			cresootstruik	créosotier		
<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.	Asparagaceae		<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	kuifhyacinth	muscari à toupet		
<i>Leucojum vernum</i> L.	Amaryllidaceae			lenteklokje	nivéole de printemps		
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Oleaceae			wilde liguster	troène commun		
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae			vlasbekje	linaire commune	Een afwijking kan worden gevraagd aan, en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier

						indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat quinazoline alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze quinazoline alkaloiden.	démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes quinazoliniques, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes quinazoliniques scientifiquement fondée.
<i>Liriope</i> spp.	Asparagaceae						
<i>Lithospermum</i> spp.	Boraginaceae						
<i>Lobelia inflata</i> L.	Campanulaceae					e.a. grémil	
<i>Lonchocarpus</i> spp.	Leguminosae					lobélie enflée	
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliaceae					chèvrefeuille des jardins	
<i>Lupinus</i> spp.	Cactaceae					lupin	
						lupine	
						Enkel de cultivars met lage gehalten aan alkaloiden van de planten <i>Lupinus</i> <i>angustifolius</i> L. en <i>Lupinus albus</i> L. kunnen worden toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloiden en geen anagyrrine bevatten.	Seuls les cultivars à faible teneur en alcaloïdes des plantes <i>Lupinus</i> <i>angustifolius</i> L. et <i>Lupinus albus</i> L. peuvent être autorisés dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que les graines et la farine des plantes <i>contiennent</i> au maximum 200 mg/kg d'alcaloïdes totaux et pas d'anagyrrine.
<i>Lycoris</i> spp.	Amaryllidaceae						
<i>Lyonia</i> spp.	Ericaceae						

<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae		dalkruid	maianthème à deux feuilles		
<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae		kamalaboom	kamala, rottlière des teinturiers		
<i>Mandragora officinarum</i> L.	Solanaceae		alruin	mandragore officinale		
<i>Meconopsis</i> spp.	Papaveraceae		schijnpapaver			
<i>Menispermum canadense</i> L.	Menispermaceae		Canadees Maanzaad.	Ménisperme du Canada		
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiaceae		tuinbingelkruid	mercuriale annuelle		
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Euphorbiaceae		bosbingelkruid	mercuriale vivace		
<i>Mesembryanthemum</i> spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Aizoaceae		o.a. middagbloem, ijskruid	e.a. ficoïde glaciale		
<i>Mimosa</i> spp.	Leguminosae			mimosa		
<i>Mosannonna depressa</i> (Baill.) Chatrou	Annonaceae	Guatteria gaumeri Greenm.	yumel	yumel		
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat harmaan alkaloiden, levo-dopa, lectines en/of niet proteïnogene aminozuren bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes de type harmaline et/ou de la levo-dopa et/ou des lectines et/ou des acides aminés non protéinogènes, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de

					onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze harman alkaloiden, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor levo-dopa, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze lectines en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze niet proteïenogene aminozuren.	(chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes de type harmane scientifiquement fondée, à la valeur DNEL de levo-dopa scientifiquement fondée, à la valeur DNEL de (chacune de ou la plus toxique de) ces lectines scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces acides aminés non protéinogènes scientifiquement fondée.
Myoporium laetum G. Forst.	Scrophulariaceae			Ngaio boom	Arbre Ngaio	
Narcissus spp.	Amaryllidaceae			witte narcis, dichtersnarcis	narcisse des poètes	
Nerium spp.	Apocynaceae			oleander	jaurier-rose	
Nicotiana spp.	Solanaceae			o.a. tabak	tabac	
Nigella damascena L.	Ranunculaceae			jufferje-in-'t-groen	nigelle de damas	
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae			witte waterlelie	nymphéa blanc	
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae			geurende waterlelie	nymphéa odorants	
Ochrosia spp.	Apocynaceae					
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae			addertong	ophioglosse commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoonst dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
						Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant

						van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor ptaquiloside.	du ptaquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de ptaquiloside scientifiquement fondée.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae					voegelmelk	ornithogale
Orobanchae spp.	Orobanchaceae					bremraap	orobanche
Oxalis spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Oxalidaceae					klaverzuring	oxalide, oxalis
Paeonia spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Paeoniaceae					pioen	pivoine
Papaver somniferum L.	Papaveraceae					slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal
							La graine (graine de pavot) peut être vendue au consommateur final ou être utilisée sur ou dans des produits de boulangerie si la denrée alimentaire est conforme aux dispositions de la section 2.5 (alcaloïdes opioïdes) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006

						Verordening (EG) nr. 1831/2006	
Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae			eenbes	parisette		
Parthenocissus quinquefolia (L.)	Vitaceae			vijfbladige wingerd	vigne vierge		
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae			yohimbe	yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitrariaceae			harmala	harmal		
Petasites spp.	Compositae			hoefblad	pétasite		
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae						
Pfaffia spp.	Amaranthaceae						
Philodendron spp.	Araceae						
Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae			calabarbonen	feves de calabar		
Phytolacca spp.	Phytolaccaceae			karmozijnbes	phytolaque		
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae				Pieris andromède		
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae				Andromède du Japon		
Pilocarpus spp.	Rutaceae						
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae			Driebladige pinellia	Pinellia	Een afwijking voor het gebruik van de wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aan toont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat 3,4-dihydroxy-benzaldehyde en/of pinelline bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot,	Une dérogation pour l'utilisation de la racine peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du 3,4-dihydroxybenzaldehyde et/ou de la pinelline, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une

						respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor 3,4- dihydroxybenzaldehyde en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor pinelline. De voorwaarde tot analyse vervalt indien kan worden aangetoond dat de bereiding volledig conform de methode volgens de Chinese Pharmacopée wordt uitgevoerd.	ingestion supérieure à la valeur DNEL de 3,4- dihydroxybenzaldehyde scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de pinelline scientifiquement fondée. Les analyses ne sont pas nécessaires s'il peut être démontré que la préparation est réalisée en suivant en tout point la méthode de la pharmacopée chinoise.
Piper methysticum Forster f.	Piperaceae			kava, kava	kava, kava		
Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia		piscidie		
Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoet	podophylée pelté			
Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	oranger trifolié			
Psoralea spp.	Rubiaceae						
Psychotria viridis Ruiz. Et Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacruna	Sami Ruca			
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Oleaceae		adelaarsvaren	fougère-aigle			
Ptychopetalum spp.	Ericaceae						
Pyrolaria pubera Michx. Kuhn.	Santalaceae		buffelnoot				
Quassia spp.	Simarubaceae						
Quillaja saponaria Molina. (zie ook lijst 3 / voir aussi liste 3)	Quillajaceae		zeephoutboom	bois de panama, quillaia			

Ranunculus spp.	Ranunculaceae		boterbloem	renoncule		
Rauvolfia spp.	Apocynaceae					
Rhododendron spp.	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
Rhodomyrtus spp.	Myrtaceae					
Rhus spp.	Anacardiaceae		sumak	sumac		
Rhus aromatica Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	rhus aromatique	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
Rhus cortaria L.	Anacardiaceae		sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
Rhus glabra L.	Anacardiaceae		gladde sumak	sumac à bois glabre	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
Rhynchosia spp.	Leguminosae					
Richardia scabra L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	faux ipéca		
Ricinus communis L.	Euphorbiaceae		wonderboom	ricin commun		
Rivina humilis L.	Phytolaccaceae					
Roemeria hybrida L. DC.	Papaveraceae					
Rubia tinctorum L.	Rubiaceae		meekrap	garance des teinturiers		
Ruta spp.	Rutaceae					
Salvia divinorum Epling & Jativa	Lamiaceae		centraal Amerikaanse salie	sauge des aztèques		
Sanguinaria canadensis L.	Papaveraceae		bloedwortel	sanguinaire du canada		
Sansevieria spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	sansevière		
Santalum album L.	Santalaceae		sandelboom	Santal blanc, sandal		

Sassafras albidum (Nutt.) Nees	Lauraceae	Sassafras officinale T. Nees & C.H. Eberm.	bois de sassafras			
Saussurea spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Compositae					
Schefflera spp.	Araliaceae					
Schinus molle L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	faux poivrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukerbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schinus terebinthifolius Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	baies roses, poivre rose	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukerbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schoenocaulon officinale (Schtdl. & Cham.) A. Gray	Melanthiaceae	Sabadilla officinalis (Schtdl. & Cham.) Standl. Brandt. Et Ratzeb.	Sabadilkruid	cévadille		
Scindapsus spp.	Araceae					
Scopolia spp.	Solanaceae					
Scrophularia spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Scrophulariaceae		helmkruid	scrofulaire		
Scutellaria baicalensis Georgi (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Lamiaceae		Baikalgldkruid	Scutellaire du lac Baikal	Het gebruik van de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.
Scutellaria lateriflora L. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Lamiaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantebereidingen indien het dossier	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen

					middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat furano neoclerodanen bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze furano neoclerodanen. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des furano néoclérodanes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces furano néoclérodanes scientifiquement fondée. Les analyses ne sont pas nécessaires s'il peut être démontré par un certificat botanique que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Scutellaria spp.	Lamiaceae			blauw glidkruid	scutellaire toque	
Securigera varia (L.) Lassen	Leguminosae	Coronilla varia L.		bont kroonkruid	coronille bigarrée	
Senecio spp.	Compositae			kruiskruid	sénéçon	
Sesbania spp.	Leguminosae					
Sida cordifolia L.	Malvaceae			bala	bala	
Sida rhombifolia L.	Malvaceae					
Simarouba amara Aubl.	Simaroubaceae					
Solandra grandiflora Sw.	Solanaceae				liane trompette	
Solanum americanum Mill.	Solanaceae			Amerikaanse zwarte nachtschade,	morelle noire d'Amérique	
Solanum nigrum L.				Zwarte nachtschade	morelle noire	
Solanum dulcamara L.	Solanaceae			bitterzoet	douce-amère, morelle douce-amère	

<i>Strychnos</i> spp.	Loganiaceae								
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae		sneeuwbes				symphorine		
<i>Symphytum</i> spp.	Boraginaceae		smeetwortel				consoude		
<i>Tabebuia</i> spp.	Bignoniaceae								
<i>Tabernanthe iboga</i> Baill.	Apocynaceae		iboga				iboga		
<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch. Bip	Compositae	<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> (Trevir.) Vis.	dalmatisch vlootlenkruid				pyréthre		
<i>Taxus</i> spp.	Taxaceae		taxus				if		
<i>Tephrosia</i> spp.	Leguminosae								
<i>Tetradlepis articulata</i> (Vahl.) Mast.	Cupressaceae	<i>Callitris quadrivalvis</i> Vent. <i>Callitris quadrivalvis</i> Rich. & A.Rich.	sandarak, kamercipres				sandaraque, thuja de Barbarie		
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Lamiaceae		echte gamander				germandrée petit-chêne		
<i>Teucrium polium</i> L.	Lamiaceae						germandrée tomenteuse		
<i>Thevetia</i> spp.	Lamiaceae								
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Apocynaceae		o.a. gele oleander				e.a. laurier-rose jaune		
<i>Trichocereus</i> spp.	Cactaceae		westerse levensboom				thuya d' occident		
<i>Trichodesma incanum</i> Bunge	Boraginaceae								
<i>Trollius europaeus</i> L.	Ranunculaceae		europese trollius				trolle d' europe		
<i>Tulipa</i> spp.	Liliaceae		tulp				tulipe		
<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	Convolvulaceae								
<i>Tussilago</i> spp.	Compositae		klein hoefblad				tussilage		
<i>Tylophora asthmatica</i> Wight et Arn.	Apocynaceae						asmatica, faux-ipec		
<i>Urginea</i> spp.	Asparagaceae		zeeajuin				scille maritime		
<i>Veratrum</i> spp.	Melanthiaceae		nieswortel				vératre		
<i>Viburnum prunifolium</i> L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal				viorne à feuilles de prunier		

Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	dompte-venin		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauwvregen	glycine du japon		
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauwvregen	glycine de chine		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	uzara		
Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoonst dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoonst dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant

Zanthoxylum armatum DC.	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout	zanthoxyllle	van het eindproduct dat alkaloïden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae		alkaligras	cannash	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloïden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL- waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.

Lijst 2: Eetbare paddenstoelen

Lijst 2: Champignons comestibles

Deel 1: Gekweekte eetbare paddenstoelen

Partie 1: Champignons comestibles cultivés

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Fransse naam		
<i>Agaricus arvensis</i> Sch.: Fr.	Agaricaceae		Anijschampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Albidus</i> (Lange) Sing.	Agaricaceae		Gekweekte champignon	Agaric bispore, Champignon de Paris, variété blanche		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Avellanuss</i> (Lange) Sing.	Agaricaceae		Kastanjechampignon	Agaric bispore, Champignon de (Paris, variété blonde)		
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliotte des trottoirs		
<i>Agaricus campestris</i> L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaricaceae		Slanke anjischampignon	Agaric sylvicole		
<i>Agaricus subrufescens</i> Peck	Agaricaceae	<i>Agaricus blazei</i> Murill	Amandelpaddenstoel	Agaric auguste		
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.: Fr.) Maire	Boletaceae		Populierleemhoed	Pholiote du Peuplier, Pivoulade		
<i>Boletus aereus</i> Bull. ex Fr.	Boletaceae		Bronskleurig eekhoornjesbrood	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre		
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Boletaceae	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoornjesbrood	Cèpe d'été		
<i>Boletus rex-veris</i> D. Arora & Simonini	Boletaceae			Cèpe Roi du printemps		
<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	<i>Paeclomyces hepiali</i> Q.T.			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Seule l'utilisation dans les compléments

		Chen & R.Q. Dai Ophiocordyceps sinensis				alimentaires est autorisée.
<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	Physalaciaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		Gesteelde lakzwam	Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant		
<i>Ganoderma tsugae</i> Murr.	Ganodermataceae					
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	Meripilaceae		Eikhaas	Poule de bois, Polypore en touffes		
<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat	Meripilaceae		Schermpjeselkhaas			
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.: Fr.) Kummer	Strophariaceae		Dennezwavelkop	Hypholome doux		
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.: Fr.) Pers.	Hericiaceae		Pruikzwam	Hydne hérisson		
<i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
<i>Hypsizygus tessulatus</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Lyophyllaceae		Buna Shimeji	Buna Shimeji		
<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.: Fr.) Kühner	Lyophyllaceae		Iepenzwam	Lyophylle de l'Orme		
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.: Fr.) Murrill	Fomitopsidaceae		Zwavelzwam	Polypore souffré		
<i>Lasiosphaeria gigantea</i> Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae					
<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	Marasmiaceae		Shiitake	Shiitake	De consumptie van rauwe of licht gekookte Shiitake kan leiden tot huidreacties. Het is aanbevolen om de Shiitake ongeveer 20 minuten te koken voor	La consommation de Shiitake cru ou peu cuit peut provoquer des réactions cutanées. Il est recommandé de cuire le shiitake

						consomptie of het te verwarmen tot een temperatuur van 130 - 150 °C. De gedroogde paddenstoelen zouden voldoende moeten worden gehydrateerd vóór het koken	pendant environ 20 minutes avant de le consommer ou de le chauffer à une température de 130 à 150 °C. Les champignons séchés doivent être suffisamment hydratés avant la cuisson.
<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae			Parse schijnridder		Pied bleu	
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	Agaricaceae			Blanke Parasolzwam		Lépiote pudique	
<i>Lyophyllum shimeji</i> (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae			Hon-Shimeji		Hon-Shimeji	
<i>Morchella esculenta</i> (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae			Gewone morielje		Morille commune	
<i>Pholiota mutabilis</i> (Scop.: Fr.) Kumm. Smith & Singer	Strophariaceae			Kleine bundelzwam		Pholiote changeante	
<i>Pholiota nameko</i> (I. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae			Nameko		Nameko	
<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae			Trechteroesterzwam		Pleurote corne, Rolland d'abondance	
<i>Pleurotus citrinopileatus</i> Singer	Pleurotaceae			Goudkleurige oesterzwam		Pleurote jaune	
<i>Pleurotus columbinus</i>	Pleurotaceae						
<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae			Trechteroesterzwam		Pleurote corne, Rolland d'abondance	
<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Miller	Pleurotaceae						
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae			Kruisdisteloesterzwam		Pleurote du Pancaut	
<i>Pleurotus flabellatus</i> (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae						
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae			Gewone oesterzwam		Pleurote en huitre	

Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Bleke oesterzwam	Pleurote pulmonaire	
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer	Pleurotaceae				
Pleurotus salmoneostramineus Vassil	Pleurotaceae		Zalmoesterzwam	Pleurote saumon	
Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae		Floridazwam	Pleurote de Floride	
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Polyporaceae		Schermpjesekhaas	Polypore en ombelle	
Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae		Blauwplaatstropharia	Strophaire à anneau rugeux	
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer	Pluteaceae		Rijstrozswam, Tropische beurszwam	Volvaire cultivée	

De paddenstoelen vermeld in deel 2 van lijst 2 in de mate dat ze kunnen geteeld worden en voor menselijke consumptie geschikt blijven.

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine

Deel 2: Wilde paddenstoelen die mogen in de handel gebracht worden in zoverre de reglementering van bedreigde soorten dat toelaat

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Famille	Synonyme	Nederlandse naam	Fransse naam		
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalote des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric champêtre		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleenhoe	Pholote du jeuplier, Pivoulade		
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam	Pézize orangée		
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray	Amanitaceae		Parelamaniet	Amanite rougissante; Golnotte		
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l.	Physalaciaceae		Honingzwam s.l.	Armillaire couleur de miel s.l.		

Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Boletus badius non sensu Persoon	Boletaceae	Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert	Kastanjeboleet	Bolet bai		
Boletus edulis Bull.: Fr.	Boletaceae		Eekhoornjesbrood	Cépe de Bordeaux		
Boletus erythropus Pers.	Boletaceae		Gewone helsenboleet	Bolet à pied rouge		
Bovista plumbea Pers.	Agaricaceae		Loodgrijze bovist	Boviste plombée	Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.	Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer	Lyophyllaceae		Voorjaarspronkridder	Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron		
Cantharellus cibarius Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Hanekam; Dooierzwam; Cantharel	Chanterelle orangée		
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Trechterscantharel	Chanterelle en tube		
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers.	Cantharellaceae		Hoorn-van-overvloed	Trompette de la mort		
Disciotis venosa (Pers.: Fr.)	Morchellaceae		Grote aderbekerzwam	Pézize veinée		
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalaciaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
Hydnum repandum L.: Fr.	Hydnaceae		Gele stekelzwam	Pied de mouton		
Hygrophoropsis aurantiaca (Wlf.: Fr.) Maire	Hygrophoropsidaceae		Valse cantharel	Fausse girolle		
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Hydnangiaceae		Amethystzwam; Rode koolzwam	Laccaria amethyste		
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke	Hydnangiaceae		Fopzwam	Laccaria laqué		
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray	Russulaceae		Oranje-groene melkzwam	Lactaire délicieux		
Langemannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.	Agaricaceae		Reuzenbovist	Vesse-de-loup géante		
Lepista inversa (Scop.) Pat.	Tricholomataceae		Roodbruine trechterzwam	Clitocybe inversé		

<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae						
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	Agaricaceae	<i>Lepiota naucina</i>	Paarse schijnridderzwam	Pied bleu			
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Singer	Agaricaceae		Grote parasolzwam	Coulemelle, Lépiote élevée			
<i>Marasmius oreades</i> (Balt.: Fr.) Fr.	Marasmiaceae		Weidekingzwam	Marasme des Oreades; Faux mousseron			
<i>Morchella angusticeps</i> Peck	Morchellaceae			Morille			
<i>Morchella elata</i> Fr.: Fr.	Morchellaceae		Kegelmorielje	Morille conique			
<i>Morchella esculenta</i> (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune			
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer	Pleurotaceae		Gewone Oesterzwam	Pleurote en forme d'huître			
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Regenboogrussula	Russule charbonnière			
<i>Russula vesca</i> Fr.	Russulaceae		Smakelijke russula	Russule comestible			
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Ruwe russula	Russule verdoyante; Palomet			
<i>Suillus granulatus</i> (L.) O. Kuntze	Suillaceae		Melkboleet	Bolet granulé			
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch: Fr.) Singer	Suillaceae		Gele ringboleet	Bolet élégant			
<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) S.F. Gray	Suillaceae		Bruine ringboleet	Bolet jaune			
<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	Tremellaceae		Witte trilzwam	Trémelle blanche			
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	Tricholomataceae		Matsu-take	Matsutake			
<i>Tricholoma populinum</i>	Tricholomataceae		Lange Populieridderzwam	Tricholome des peupliers			
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.: Fr.) Quélet	Tricholomataceae		Glanzende ridderzwam	Tricholome prétentieux			
<i>Tricholoma terreum</i> (Sch.: Fr.) Kummer	Tricholomataceae		Donkergrtije ridderzwam	Tricholome terreux; Petit-gris			
<i>Tuber aestivum</i> Vitt.	Tuberaceae		Zomertuffel	Truffe d'été			
<i>Tuber magnatum</i> Pico sp.	Tuberaceae		Witte truffel	Truffe blanche			

Tuber melanosporum Vitt.	Tuberaceae		Perigordtruffel	Truffe du Périgord		
Tuber indicum Cooke & Massee	Tuberaceae		Chinese of Aziatische truffel	Truffe chinoise ou asiatique		
Tuber uncinatum Chatin	Tuberaceae		Bourgogne truffel	Truffe de Bourgogne		
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae	Poria cocos Wolf		Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Seule l'utilisation du sclérote est autorisée.

Lijst 3: Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

Lijste 3: Plantes à notifier si sous forme prédosée

Botanische naam / Nom botanique	Familie / Famille	Synoniem / Synonyme	Naam	Nom	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parties de plante autorisée ou préparation particulière	Voorwaarden	Conditions
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	okra, gombo, cabo, calou	vrucht	fruit		
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	Malvaceae		ambrettezaad, muskuszaad	ambrette	zaad	graine		
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine		
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	Pinaceae		balsemspar, canadabalsem	sapin baumier	schors, naald, hars, twijg	écorce, aiguille, résine, brindille		
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i> (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	<i>Abies pectinata</i> Dc. Var. <i>Equi-Trojani</i> Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée	schors, naald	écorce, aiguille		
<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae		siberische zilverden	sapin de sibérie	schors, tak, naald, hars	écorce, rameau, aiguille, résine		
<i>Abroma augusta</i> L. f	Malvaceae				wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter les avertissements

								suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.	waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.
Acacia catechu (L.f.) Willd.	Leguminosae						gom	gomme	
Acacia decurrens Willd.	Leguminosae						gom	gomme	
Acacia nilotica (L.) Delile	Leguminosae	Acacia arabica (Lam.) Willd.	echte acacia, gom-acacia	acacia du nil	schors, vrucht, gom	écorce, fruit, gomme			
Acacia senegal (L.) Willd.	Leguminosae		arabische gom	gommier blanc, acacia sénégal	schors, gom	écorce, gomme			
Acacia seyal Delile	Leguminosae				gom	gomme			
Acanthus mollis L.	Acanthaceae		stekelige berenklauw	acanthé molle, acanthé à feuilles larges	hele plant	plante entière			
Acer campestre L.	Sapindaceae		Spanse aak, veldesdoorn	Érable champêtre	knop	bourgeon		L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.
Acer negundo L.	Sapindaceae		vederesdoorn	érable négundo, érable négundo, érable à figure, érable à giguère,	schors	écorce		L'analyse doit démontrer que la préparation ne	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen

Acer saccharinum L.	Sapindaceae			witte esdoorn of zilvertesdoorn	érable à feuilles de frêne, érable américain	bast, hout	liber, bois	detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Achillea ageratum L.	Compositae				achillée à feuilles d'ageratum, achillée visqueuse	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Achillea atrata L.	Compositae			dofzwart duizendblad	achillée noireâtre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erba- rotta All.	Compositae				achillée à feuilles simples	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erba- rotta subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson	Compositae			duizendblad, hemdsknoopjes, muskusduizendbl ad	achillée musquée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea millefolium L.	Compositae			gewoon duizendblad	achillée millefeuille	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea nana L.	Compositae			wilde bertram	achillée naine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea ptarmica L.	Compositae			wilde bertram	achillée sternutatoire	bovengrondse delen	parties aériennes		

Achyranthes bidentata Blume	Amaranthaceae		dubbelgetande amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	racine		
Acnella oleracea (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijnknoppenk ruid, braziliaanse cresson	cresson de para, brède mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Acorus calamus L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	acore, acore odorant, acore vrai	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van beta-asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgevocht . De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangenschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae		zilverkaars		wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :

									bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoening en.	Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
<i>Actaea racemosa</i> L.	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	zwarte amerikaanse slangenwortel	actée américaine, cimicaire	wortel, wortelstok	racine, rhizome			De anbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Actinidiaceae		kiwi, chinese kruisbes	kiwi, groselle de chine	vrucht, knop	fruit, bourgeon				
<i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.)	Actinidiaceae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bourgeon				

C.F.Liang & A.R.Ferguson										
Adansonia digitata L.	Malvaceae						fruit			
Adiantum capillus-veneris L.	Preridaceae	baobab	baobab, pain de sirige	capillaire, cheveux de vénus	hele plant	plante entière		De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.	
Adiantum pedatum L.	Adiantaceae	hoefijzervaren	adiante du canada, capillaire du canada, adiante pédaléc		hele plant gekookt of gedroogd	plante entière cuite ou sechée		De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.	
Adoxa moschatellina L.	Adoxaceae						plante entière			

Aegopodium podagraria L.	Apiaceae		zevenblad	égopode podagraire, herbe aux gouffeux, podagraire	blad	feuille		
Aesculus hippocastanum L.	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	marronnier commun, marronnier d'inde	zaad, bladknop	graine, bourgeon de feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	Aframomum angustifolium Sonn.	madagascar cardamom	manigette fine, cardamom de Madagascar	vrucht, zaad	fruit, graine		
Aframomum excapum (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, graine		
Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boeche	buchu	blad	feuille		
Agathosma crenulata (L.) Pillans	Rutaceae	Barosma crenulata (L.) Hook., Barosma serratifolia (Curtis) Willd.	cironde buchu		blad	feuille		

Agathosma serratifolia (Curtis) Spreeth	Rutaceae						blad	feuille			
Agave americana L.	Asparagaceae		honderdjarige aloë	agave américain, agave d'amérique	bloemstengel	tige florale					
Agave sisalana Perrine	Asparagaceae		sisal	sisal	bloemstengel, wortel	tige florale, racine					
Agave tequilana F.A.C. Weber	Asparagaceae		blauwe agave	agave bleu	bloemstengel, blad	tige florale, feuille					
Agrimonia eupatoria L.	Rosaceae		gewone agrimonie	agremoine eupatoire	hele plant	plante entière					
Agrimonia repens L.	Rosaceae	Agrimonia odorata Mill.	welriekende agrimonie	agremoine odorante	bovengrondse delen	parties aériennes					
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.	Lamiaceae		akkerzenegroen	bugle petit pin, d'ive ou d'ivette	bovengrondse delen	parties aériennes					
Ajuga iva (L.) Schreb.	Lamiaceae			ivette musquée, germandrée musquée, bugle fausse ivette	bovengrondse delen	parties aériennes					
Ajuga reptans L.	Lamiaceae		kruipend zenegroen	bugle rampante	bovengrondse delen	parties aériennes					
Albizia julibrissin Durazz.	Leguminosae		perzische slaapboom, zijdeboom	acacia de constantinople, arbre de soie	schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.			
Alcea rosea L.	Malvaceae	Althaea rosea (L.) Cav	stokroos	passee-rose, passeroze, rose trémière	bloem	fleur					
Alchemilla vulgaris L.	Rosaceae	Alchemilla xanthochlora Rothm.	spitslobbige vrouwenmantel	alchémille à lobes aigus	hele plant	plante entière					
Alisma plantago-aquatica L.	Alismataceae		grote waterveegbree	plantain d'eau commun	wortel	racine					

<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. orientale (Sam.) Juz.	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.	waterveegbree	plantain d'eau	wortelstok, knol	rhizome, tubercule		
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Sisymbrium alliaria</i> (L.) Scop.	look-zonder-look	alliaire, herbe à ail	hele plant	plante entière		
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium porrum</i> L.	oerprei	Poireau d'été	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium ascalonicum</i> L.	Amaryllidaceae		sjalot	échalote, échalorte	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		ui	oignon	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

Allium sativum L.	Amaryllidaceae				knoflook		ail cultivé	bol	bulbe	gebruik van anticoagulantia. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	concomitant d'anticoagulants. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium schoenoprasum L.	Amaryllidaceae				bieslook		ciboulette	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium ursinum L.	Amaryllidaceae				daslook		ail des ours	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Betulaceae				zwarte els		aulne noir, aulne glutineux, aulne commun	schors, bladknop, blad, gom	écorce, bourgeon de feuille,		

Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeac eae		waaieraalkwijn, waaieraloë	aloës éventail	blad, gel	feuille, gel	bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeac eae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	aloës	blad	feuille	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement

								verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	(CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloysia citrodora Palau	Verbenaceae	Lippia citrodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Her) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	verveine odorante, verveine citronnée, citronelle verveine	blad	feuille			
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae		grote galgant	grand galanga	wortelstok	rhizome			
Alpinia hainanensis K.Schum.	Zingiberaceae	Alpinia katsumadae Hayata			hele plant	plante entière			
Alpinia officinatum Hance	Zingiberaceae		kleine galgant	petit galanga	wortelstok	rhizome			

<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		justice, indiane gentiaan	echinacée d'inde	blad	feuille		
<i>Aenarrhena asphodeloides</i> Bunge	Asparagaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae		dille	aneth, fenouil bâtard	vrucht	fruit		
<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae		grote engelwortel	angélique vraie	hele plant	plante entière		
<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		aziatische engelwortel, bai zhi	bai zhi	wortel	racine		
<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae		shishiudo, du huo	shishiudo, du huo	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Apiaceae		chinese engelwortel, dong quai	angélique chinoise, dong quai	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae		gewone engelwortel	angélique des bois	blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	Cusparia officinalis Engl.; Cusparia trifoliata (Willd.) Engl. Galipea officinalis Hancock	angusturaboom	angusture vrai	schors	écorce		
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae		zuurzak, guanábana	corossolier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae				custardappel, ossenhart	cachiman, corossolier réticulé, anone cœur de bœuf, cœur de bœuf	vrucht rijpe	fruit mûr	hoeveelheden acetogenines bevat. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	quantité détectable en acetogénines. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acetogénines.
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae				zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	attier, pommier cannelle	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acetogénines.
<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretaceae						bast, gom	liber, gomme		
<i>Anredera baseloides</i> (Kunth) Baill.	Basellaceae						blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Compositae				rozenkransje	pied-de-chat, pied-de-chat dioïque	bovengrondse delen	parties aériennes		

Anthemis tinctoria L.	Compositae		gele kamille	anthémis des teinturiers, camomille des teinturiers	hele plant	plante entière		
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Apiaceae		echte kervel	autres noms communs : camomille puante, anthémis puante, camomille des chiens, maroute, camomille maroute, marouette, anthémis cotule, anthémis bâtarde, œil-de-vache.	bloeiende toppen	sommités fleuries		
Anthyllis vulneraria L.	Leguminosae		wondklaver	vulnéraire	hele plant	plante entière		
Antirrhinum majus L.	Plantaginaceae		grote leeuwenbek	grand muflier, muflier à grandes fleurs, gueule-de-loup, gueule-de-lion	bovengrondse delen	parties aériennes		
Aphanes arvensis L.	Rosaceae	Alchemilla arvensis (L.) Scop.	grote leeuwenklauw	alchemille des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA	algue blue-vert du lac Klamath, AFA	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat. Het gehalte aan microcystine moet onder 1 µg/g zijn.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en toxines marines. La teneur en microcystine doit être

									inférieure à 1 µg/g.	
<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae					hele plant	plante entière			
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Leguminosae					zaad, vette olie	graine, huile grasse			
<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Araliaceae					blad, wortelschors	feuille, écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.	
<i>Aralia racemosa</i> L.	Araliaceae					wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.	
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae					vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.	
<i>Arcium lappa</i> L.	Compositae					hele plant	plante entière			

Arctium minus (Hill) Bernh.	Compositae	Lappa minor Hill	kleine klit	petite bardane	hele plant	plante entière	
Arctium tomentosum Mill.	Compositae		donzige klit	bardane tomentose, bardane poilue	hele plant	plante entière	
Argania spinosa (L.) Skeels	Sapotaceae		arganboom	arganier	vrucht, pitolie	fruit, huile de noyaux	Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae		mierikswortel, mierik	raifort, cranson	wortel	racine	
Artemisia abrotanum L.	Compositae	Artemisia procera Willd.	citroenkruid	aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, arque buse.	bovengrondse delen	parties aériennes	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia absinthium L.	Compositae		absintalsem		bovengrondse delen	parties aériennes	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone

Artemisia capillaris Thunb.	Compositae				velriekende alsem	armoise capillaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia dracunculus L.	Compositae				dragon	estragon	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia frigida Willd.	Compositae				westerse bijvoet	armoise douce	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia genipi Weber ex Stechn.	Compositae				alpenbijvoet	génépi vrai, génépi noir	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

<i>Artemisia glacialis</i> L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia judaica</i> L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia pontica</i> L.	Compositae		kleine alsem, pontische alsem	petite absinthe, absinthe romaine		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Compositae		kleine alpenabsint	génépi blanc		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	Compositae			armoise du valais		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière

								hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Compositae			bovengrondse delen	parties aériennes			De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae			bovengrondse delen	parties aériennes			De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae			vrucht, zaad, hout	fruit, graine, bois			Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
<i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) Jolis	Fucaceae			thallus	thallus				

Asimina triloba (L.) Dunal	Annonaceae		pawpaw	asiminier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenerines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae		aspalathus, rooibos thé	aspalathus, rooibos thé	bovengrondse delen	parties aériennes		
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.	Asparagaceae		chinese asperge	asperge chinoise	wortel	racine		
Asparagus officinalis L.	Asparagaceae		asperge	asperge	wortel, scheut	racine, pousse		
Asparagus racemosus Willd.	Asparagaceae		satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome		
Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.			gom	gomme		
Astracantha cretica (Lam.) Podlech	Leguminosae	Astragalus creticus Lam.			gom	gomme		
Astracantha gummifera (Labill.) Podlech	Leguminosae	Astragalus gummifer Labill.			gom	gomme		
Astracantha microcephala (Willd.) Podlech	Leguminosae	Astragalus microcephalus Willd.			gom	gomme		
Astragalus membranaceus Fisch. ex. Bunge	Leguminosae				wortel	racine		
Astragalus membranaceus Moench	Leguminosae		astragalus	astragale	wortel	racine		

Astrantia major L.	Apiaceae			zeeuws knooppje, groot sterrenscherm	grande astrance, grande radiaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Athamanta macedonica (L.) Spreng.	Apiaceae					vrucht, blad	fruit, feuille		
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.	Compositae					wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Atractylodes macrocephala Koidz.	Compositae					wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Atractylodes ovata (Thunb.) DC.	Compositae					wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre

Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	bamboe	bambou tabashir	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Bambusa vulgaris Schrad.	Poaceae		bamboe	bambou	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	cresson de terre, barbarée printanière	bovengrondse delen	parties aériennes		
Barbarea vulgaris R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	barbarée commune, herbe de sainte-barbe	bovengrondse delen	parties aériennes		
Bellis perennis L.	Compositae		madeliefje	pâquerette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Berberis aquifolium Pursh.	Berberidaceae	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	mahonia aquifolium (pursh) nutt.	mahonia	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Berberis aristata DC.	Berberidaceae				wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine)

<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae			zuurbes	epine-vinette	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	superieure à 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoliniques (exprimée en berbéridine) supérieure à 10 mg.
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae			paranoot, brazilnoten, Amazonianoten	noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil	noot	noix		
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae			gekweekte biet	betterave cultivée	hele plant	plante entière		
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	Betulaceae			gele berk	bouleau jaune	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Betula lenta</i> L.	Betulaceae			suikerberk	bouleau flexibel, bouleau acajou, bouleau merisier	schors, blad, sap	écorce, feuille, sève		
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulaceae			ruwe berk	bouleau veruqueux, bouleau blanc	knop, schors, blad, teer, sap	bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève		
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betulaceae			zachte berk, gewone berk	bouleau pubescent, bouleau des marais	knop, schors, blad, sap	bourgeon, écorce, feuille, sève		
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae			orleanboom	rocouyer	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine		

Blainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	brèdes mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagte, komkommerkruid	bourrache, bourrache officinale	bloem, zaad	fleur, graine	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalt en aan bepaalde verontreiniginge n in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatie- dossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.

Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengrondse delen	parties aériennes		
Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		wierookboom	arbre à encens	gomhars	gomme-résine		
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		wierookboom	encens	oliehars, gomhars	oléorésine, gomme-résine		
Brassica cretica Lam.	Brassicaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae		zwarte mosterd	moutarde noire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica oleracea L.	Brassicaceae		incl. tuinkool	incl. chou potager	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en

Brassica rapa L.	Brassicaceae	Sinapis juncea L.	raapzaad	navette d'été	hele plant	plante entière	schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Buglossoides arvensis	Boraginaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae		sikkelgoudschem	buplèvre chinoise	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheek bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling)	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae		doorwas	buplèvre à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheeker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète.
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae						vrucht, schors	fruit, écorce
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosae					canique grise, z'yeux à chatte	schors, zaad	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophylotoxin e et analogues.
Cakile maritima Scop.	Brassicaceae					roquette de mer, cakilier maritime, tétine de souris	blad, wortel	
Calendula arvensis (Vaill.) L.	Compositae					souci des champs, souci sauvage	bloem	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.
Calendula officinalis L.	Compositae					souci officinal	bovengrondse delen	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.
							parties aériennes	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne

								bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.	pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae		struikhei		callune, bruyère commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Camelina sativa (L.) Crantz	Brassicaceae		huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter		cameline, lin bâtard	zaad	graine		
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Theaceae		theestruik		théier	blad	feuille	Het voedings-supplement dat extracten bevat die worden vermeld in bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen, dient te voldoen aan de bepalingen van ditzelfde reglement. De aanbevelen	Le complément alimentaire contenant des extraits énumérés à l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, doit être conforme aux dispositions de ce même règlement. La portion

										supérieure à 0,6 mg.
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseraceae							noot	noix	
Capparis spinosa L.	Capparaceae		kappertjes	câprier commun, câprier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes				
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.	Brassicaceae		gewoon herderstasje	bourse-à-pasteur commune	bovengrondse delen	parties aériennes				
Capsicum annuum L.	Solanaceae	Capsicum frutescens L.	spaanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée	vrucht	fruit				
Carex arenaria L.	Cyperaceae		zandzegge	laïche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome				
Carica papaya L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papayer	vrucht	fruit				
Carissa carandas L.	Apocynaceae		kristusdoorn	karonda	vrucht, blad	fruit, feuille				
Carlina acaulis L.	Compositae		zilverdistel	carline acaule	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden carlina oxide bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings- supplementen.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en oxyde de carline. L'huile essentielle isolée de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.		
Carlina acaulis subsp. caulescens	Compositae		hoge zilverdistel	carline argentée	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen	L'analyse doit démontrer que la préparation ne		

(Lam.) Schübl. & G.Martens								detecteerbare hoeveelheden carlina oxide bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings-supplementen.	contient aucune quantité détectable en oxyde de carline. L'huile essentielle isolée de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Carpinus betulus L.	Betulaceae		haagbeuk	charme	knop, blad	bourgeon, feuille			
Carthamus lanatus L.	Compositae			carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur			
Carthamus tinctorius L.	Compositae		saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine			
Carum carvi L.	Apiaceae		echte karwij	carvi, cumin de prés	vrucht	fruit			
Cassia fistula L.	Leguminosae		indische goudenregen	canéficier, cassier	vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les	

									waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen; Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Castanea sativa Mill.	Fagaceae		tamme kastanje	châtaigner, châtaignier commun	schors, bladknop, blad, zaad	écorce, bourgeon de feuille, feuille, graine				
Catalpa bignonioides Walter	Bignoniaceae		groene trompetboom	catalpa bignioïdes, arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun	blad	feuille				
Ceanothus americanus L.	Rhamnaceae		amerikaanse sering	thé du new jersey	blad	feuille		Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloïden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes peptidiques.	
Cecropia peltata L.	Urticaceae			bois trompette, coulequin	hele plant	plante entière		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre	

										apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	pharmacies en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Pinaceae				libanonceder, libanese cedar	cèdre du liban	kegelvrucht, blad, hout	cône, feuille, bois			
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae				kapokboom	kapokier, bois coton, fromager	bast, blad, olie van het zaad	liber, feuille, huile de la graine			
<i>Centaurea behen</i> L.	Compositae						bloem	fleur			
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Compositae				kalketrip	centaurée chausse-trape, centaurée étoilée, chardon étoilé	bloem	fleur			
<i>Centaurea centaurium</i> L.	Compositae				centaurie, groot duizendguldenkru id	grande centaurée	bloem	fleur			
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae				korenbloem	bleuet des champs, centaurée bleuet	bloem	fleur			
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae				knoopkruid	centaurée jaccée, tête de moineau, ambrette	bloem	fleur			
<i>Centaurea montana</i> L.	Compositae				bergcentaurie	centaurée des montagnes	bloem	fleur			
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Gentianaceae				echt duizendguldenkru id	erythraée petite centaurée	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae				gotu kola	hydrocotyle d'asie	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC	Caprifoliaceae				rode spoorbloem, rode valeriana	valériane rouge, centranthe rouge	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité	

Chenopodium vulvaria L.	Amaranthaceae		stinkende ganzenvoet	vulvaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.	Ericaceae	Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl	pijsisseva	chimaphile à ombelles, pirole en ombelle	hele plant	plante entière		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiaceae			bejuco de berac	wortel	racine		
Chionanthus virginicus L.	Oleaceae		sneeuwvlokkenbo om	arbres à neige	wortelschors	écorce de racine		
Chlorella vulgaris Beijerinck	Chlorellaceae	Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	ééncellige alg	algue unicellulaire		
Chondrus crispus Stackhouse	Gigartiniaceae		iers moswier	varech, mousse d'Irlande	thallus	thallus		
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke	Compositae			chrysanthellum	bloeiende toppen	sommités fleuries		
Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum B.L. Turner	Asteraceae		gele kamille	camomille d'or.	bovengrondse delen	parties aériennes		
Chrysophyllum cainito L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	caimitier, cainite	vrucht	fruit		
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty	Poaceae		vetiver	vétiver	wortel	racine		
Cichorium endivia L.	Compositae		andijvie	chicorée endive	blad	feuille		
Cichorium intybus L.	Compositae		wilde cichorei	chicorée sauvage	hele plant	plante entière		

Cinchona calisaya Wedd.	Rubiaceae	Cinchona ledgeriana (Howard) Bern.Moens ex Trimen	kinaboorn, quinaboorn	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona lancifolia Mutis	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona micrantha Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de

Cinchona nitida Ruiz & Pav.	Rubiaceae									schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona officialis L.	Rubiaceae		kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya						schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae							schors	écorce	toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	administrer aux enfants de moins de 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquette doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pubescens Vahl	Rubiaceae							schors	écorce	toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	administrer aux enfants de moins de 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquette doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl	Lauraceae							hele plant	plante entière		

Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl.	Lauraceae	Cinnamomum aromaticum Nees	chinese kaneel	cannelier de chine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cinnamomum verum J.Presl.	Lauraceae	Cinnamomum zeylanicum Blume, C. zeylanicum Nees	kaneelboom, ceylonkaneel	cannelier, cannelier de ceylan	schors, blad	écorce, feuille		
Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae				stengel	tige		
Cistus creticus L.	Cistaceae	Cistus ladaniferus Stokes	rotsroos	ciste de crête	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Cistus × incanus L.	Cistaceae		cistustroos	ciste à gomme	hele plant	plante entière		
Cistus monspeliensis L.	Cistaceae		rotsroos	ciste de montpellier	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		watarmeloen	pastèque	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	lime, limettier	vrucht	fruit		
Citrus aurantium L.	Rutaceae	Citrus aurantium L. ssp. amara Engl., Citrus aurantium L. ssp. sinensis L., Citrus aurantium L. ssp. aurantium L.	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	orange amère, bigaradier orange de curaçao	bloem, vrucht, pericarp	fleur, fruit, péricarpe	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

Citrus medica L.	Rutaceae	Citrus decumana L.	sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédraatier	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae	Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto	chinois	vrucht, pericarp	fruit, péricarpe		
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae				vrucht	fruit		
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae		grapefruit	grapefruit	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae		mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarinier, clémentine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus sinensis (L.) Osbeck	Rutaceae		sinaasappel	oranger	bloem, blad, vrucht	fleur, feuille, fruit		
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		echt rendiermos	lichen des rennes, lichen des caribous	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculaceae		bostrank	clématite d'armand	gedroogde stengel	tige séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

								hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	racine séchée		Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball			blad	feuille			
Clinopodium vulgare L.	Lamiaceae	Calamintha vulgaris (L.) Druce	borstelkrans	clinopode, clinopode commun, sariette vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes			
Clitoria ternatea L.	Leguminosae		kittelbloem	pois bleu	bloem	fleur		Analyse moet aantonen dat de	L'analyse doit démontrer que

										la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.
<i>Cnicus benedictus</i> L.	Compositae			gezegende distel	chardon-bénit	bovengrondse delen	parties aériennes		berediging geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat.	
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae			echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae			kokospalm	cocotier	zaad, vette olie	graine, huile grasse			
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	Campanulaceae			codonopsis	codonopsis	wortel	racine			
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae			koffie (boom)	caféier	zaad	graine			
<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	Rubiaceae	<i>Coffea robusta</i> Lind. ex De Wild		robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine			
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Poaceae			jobstranen	larmes de job	zaad	graine			
<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i> (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	<i>Coix ma-yuen</i> Rom. Caill.		jobstranen	larmes de job	zaad, olie van het zaad	graine, huile de la graine			
<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae			kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine			
<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae			kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine			
<i>Coleus forskohlii</i> (Poir.) Briq.	Lamiaceae					bovengrondse delen, wortel	parties aériennes, racine		De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec

								gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Combretum micranthum G. Don	combretaceae			kinkeliba	kinkéliba	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Combretum sudaicum Miq.	Combretaceae					blad, bladsteel	feuille, pédoncule		
Commiphora africana (A. Rich.) Endl.	Burseraceae			afrikaanse mirre	myrthe africaine	gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora habessinica (O. Berg) Engl.	Burseraceae					gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

<i>Coptis japonica</i> (Thumb.) Makino	Ranunculaceae					wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoliniques (coptisine) en supérieure à 10 mg.
<i>Coptis teeta</i> Wall.	Ranunculaceae					wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoliniques (coptisine) en supérieure à 10 mg.
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Ranunculaceae				coptide trifoliée	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoliniques (coptisine) en supérieure à 10 mg.
<i>Corallina</i> <i>officinalis</i> L.	Corallinaceae					thallus	thallus		

Cordia myxa L.	Boraginaceae		sebestenboom		vrucht	fruit	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalt en aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatie-dossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.
Coriandrum sativum L.	Apiaceae		koriander	coriandre	bovengrondse delen, olie van het zaad	parties aériennes, huile de graine	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn	Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont

									toegelaten (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Cornus florida L.	Cornaceae					grootbloemige amerikaanse kornoelje	cornouiller à fleurs d'amérique, bois-de-chien	vrucht, schors	fruit, écorce	
Cornus mas L.	Cornaceae					gele kornoelje	cornouiller mâle	vrucht	fruit	
Cornus officinalis Siebold & Zucc.	Cornaceae					japanse kornoelje	cornouiller officinal	vrucht	fruit	
Cornus sanguinea L.	Cornaceae					rode kornoelje	cornouiller sanguin, sanguin	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille	
Corrigiola telephifolia Pourr.	Molluginaceae						corrigiole à feuilles de téléphium	wortel	racine	
Corylus avellana L.	Betulaceae					hazelaar	noisetier, coudrier	bladknop, blad, vrucht, zaad	bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine	
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae					citroen eucalyptus	eucalyptus citronné	blad	feuille	
Coscinum fenestratum (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae							wortel, stengel	racine, tige	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoliniques (s (exprimée en berbéline) hoger supérieure à 10 mg.

Crambe	Brassicaceae		zeekool	chou marin, crambé maritime	hele plant	plant entière		
<i>Crataegus maritima</i> L.	Rosaceae		azaroordoorn	azarolier, azérolier	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	Rosaceae		koraalmeidoorn	aubépine à feuilles en éventail	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i> auct.	tweestijlige meidoorn	aubépine à deux styles	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de

Crataegus monogyna Jacq.	Rosaceae			eenstijlige meidoorn	aubépine à un style	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, fleur, sommité fleurie, graine	hoger dan 2,6 mg. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	flavonoides supérieure à 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.	Rosaceae					vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crithmum maritimum L.	Apiaceae			zeevenkel	fenouil marin, perce-pierre	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Crocus sativus L.	Iridaceae			saffraankrokus	safran	bloem	fleur	De etikettering moet de	L'étiquetage doit comporter les

								volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijkijdig gebruik van depressie behandeling.	avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.
Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino	Compositae						bovengrondse delen	parties aériennes	
Cruciata laevipes Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwalstro	gaillet croizette			bovengrondse delen	parties aériennes	
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensara aromatica Sonn.; Agathophyll um aromaticum (Sonn.) Willd	ravensara	ravensara aromatique, ravensara aromatica			vrucht	fruit	
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae		meloen	melon			vrucht, zaad	fruit, graine	
Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae		concommer	concombre			vrucht	fruit	
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae		reuzenpompoen	poiron			vrucht	fruit	
Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae		courgette, pompoen, sierpompoen	courge, pépon, citrouille			bloem, vrucht	fleur, fruit	
Cuminum cuminum L.	Apiaceae		korrijn	cumin officinal			vrucht	fruit	

Cupressus sempervirens L.	Cupressaceae		italiaanse cipres	cypres provençal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Curcuma longa L.	Zingiberaceae	Curcuma domestica Val., Curcuma domestica Loir., Amomum curcuma Jacq	kurkuma	curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	curcuma	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javaanse curcuma, zedoarwortelstok	safran de java, zedoaire	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulaceae		duivelsnaigaren	cuscuta de chine	zaad	grane		

Cuscuta epithymum Murray	Convolvulaceae		klein warkruid	cuscuta du thym, cuscuta à petites fleurs, petite cuscuta	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Leguminosae		guarplant	plante à guar	zaad, gom	graine, gomme		
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrader	Cucurbitaceae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, cyclanthère à feuilles digitées	vrucht, blad	fruit, feuille		
Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kwee	cognassier	vrucht	fruit		
Cymbopogon citratu (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	citronelle, lemongrass de l'amerique centrale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon javanicus subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon javanicus (Desf.) Duthie			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengrondse delen	parties aériennes		

Cymbopogon nardus (L.) Rendle	Poaceae		citronella	verveine des indes, citronnelle des indes	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.	Poaceae	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras		bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon winterianus Jovitt ex Bor	Poaceae		java citronella	citronelle de java	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cynara cardunculus L.	Compositae		kardoen	cardon	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cynara scolymus L.	Compositae		artisjok	artichaut	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cyperus rotundus L.	Cyperaceae		notengras	souchet rond	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borsvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Cytinus hypocistis (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	fleur, jus		
Daemonorops draco (Willd.) Blume	Arecaceae	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus draco Willd.			vrucht, hars	fruit, résine		
Dahlia pinnata Cav.	Compositae	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia commun	wortel	racine		
Daucus carota L.	Apiaceae		peen	carotte	wortel, zaad	racine, graine		

Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.	Compositae			tuinchrysant	chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème horticole	bloem, blad	fleur, feuille		
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae			sofiekruid	l'herbe de sainte sophie	blad, zaad	feuille, graine	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innamen hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg.
Desmodium adscendens DC.				Desmodium	Desmodium	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptam ine derivaten en alkaloïden van het type beta- carboline (type harmaline) bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la diméthyltryptam ine ni d'alkaloïdes de type bêta- carboline (type harmaline)
Dianthus caryophyllus L.	Caryophyllaceae			tuinanjier	oëillet des fleuristes	bloem	fleur		
Dimocarpus longan Lour.	Sapindaceae		Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan	longane	zaadmantel, bloem, vrucht	anille, fleur, fruit		

Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae			igname ailée, grande igname, cambarre	wortelknol	tubercule	Analyse moet antonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alkaloïdes.
Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae				wortelstok	rhizome		
Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule		
Dioscorea oppositifolia L.	Dioscoreaceae	Dioscorea opposita Thunb.	yam	yam	wortel, wortelstok	racine, rhizome		
Dioscorea polystachya Turcz.	Dioscoreaceae	Dioscorea batatas Decne	yamswortel, chinese igname	igname	wortelstok	rhizome		
Dioscorea villosa L.	Dioscoreaceae		wilde yam	igname indigène	wortelknol	tubercule		
Diospyros kaki Thunb.	Ebenaceae		kaki	kaki, plaqueminier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Diospyros virginiana L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoon	plaquemines de virginie.	vrucht, olie van het zaad	fruit, huile de graine		
Diplotaxis tenusifolia (L.) DC	Brassicaceae		grote zandkool, wilde rucola	diploaxis à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innamen hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine

Dipsacus fullonum L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier	wortel	racine		supérieure à 5 mg.
Dipsacus inermis Wall.	Caprifoliaceae	Dipsacus asper Wallich, Dipsacus asperoidis C. Y. Cheng et T. M. Ai	sechuan kaardebol, xu duan	xu duan	wortel	racine		
Dipsacus japonicus Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	dipsacus japonicus miq.	wortel	racine		
Dorstenia contrajerva L.	Moraceae				wortel	racine		
Dracocephalum moldavica L.	Lamiaceae			thé des jardins, tête de dragon, mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
Dimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae			écorce de winter, foye, cancelo	bast	liber		
Drosera anglica Huds.	Droseraceae	Drosera longifolia L.	lange zonnedauw	rossolis d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Drosera intermedia Hayne	Droseraceae		kleine zonnedauw	Droséra intermédiaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité

Echinacea angustifolia DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	échinacée à feuilles étroites	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de racine séchée.
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	echinacée pâle	hele plant	plante entière	Voor voedingssupple menten met bereidingen van de wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.
Echinacea purpurea (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoed	echinacée pourpre	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité

Echium plantagineum L.	Boraginaceae							g gedroogde kruid.	équivalente à 2 g d'herbe séchée.
								Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximale gehalt en aan bepaalde verontreiniginge n in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het	huile de la graine olie van het zaad vipérine faux- plantain slangenkruid Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283). Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit

										notificatie dossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	demonstreren deze conformiteit par analyse.
<i>Eisenia bicyclis</i> (Kjellman) Setchell	Lessoniaceae			arame	aramé	thallus	thallus				
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae			oliepalm	palmier à huile d'Afrique	olie van de pit					
<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.	Zingiberaceae			echte kardemoem, kardoen	cardanome	zaad					
<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae		Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harns.	Siberische ginseng	eleuthérocoque	wortel					
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Poaceae		Agropyron repens (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel	chiendent commun, chiendent rampant	wortelstok					
<i>Embelia ribes</i> Burm.f.	Primulaceae					wortel, blad, vrucht	racine, feuille, fruit		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae			gewoon wilgenroosje	épilobe en épi, épilobe à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes				
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae			viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgeroosje	épilobe à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes				

<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae		heermoes	prêle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Equisetum fluviale</i> L.	Equisetaceae		holpijp	prêle des eaux	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae		schaafstro	prêle d'hiver	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae		reuzenpaardenstaart	grande prêle, grande queue-de-cheval	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae		rode dophei	bruyère cendrée	bloeiwijze	inflorescences	
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae		gewone dophei	bruyère quaternée, bruyère à quatre angles, caminet	bloem	fleur	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		japanse mispel, loquat	néflier du japon, bibassier	blad, zaad	feuille, graine	
<i>Erodium californicum</i> (Hook. et Arn.) Tort.	Boraginaceae		heilig kruid, verba sancta	herbe sainte	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Erodium cicutarium</i> L'Hérit.	Geraniaceae		gewone reigersbek	bec-de-cigogne commun, erodium à feuilles de ciguë	hele plant	plante entière	
<i>Eruca vesicaria</i> L. Cav.	Brassicaceae	<i>Eruca sativa</i> Mill.	Rucola, rakersla	roquette	bovengrondse delen	parties aériennes	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg

<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae			echte kruisdistel	panicaut champêtre, chardon roulant	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae			slaapmutsje	eschscholzia de californie, pavot jaune de californie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eucalyptus dives</i> Schauer	Myrtaceae			pepermunt eucalyptus	eucalyptus mentholé	blad, twijg	feuille, brindille		
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae			eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, arbre à fièvre, gommier bleu	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucalyptus odorata</i> Behr	Myrtaceae					blad	feuille		
<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae				eucalyptus radié	blad	feuille		
<i>Eucalyptus smithii</i> R.T.Baker	Myrtaceae					schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucheuma horridum</i> J. Agardh	Solieriaceae					thallus	thallus		
<i>Eucheuma spinosum</i> J. Agardh.	Solieriaceae					thallus	thallus		
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Eucommiaceae			gutta-percha boom, chinese rubberboom	arbre à gutta- percha	schors	écorce		
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae			surinaamse kers	ceriser de cayenne	schors, bloem, vrucht, blad	écorce, fleur, fruit, feuille		
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L.		beklierde ogentroost	euphrase glanduleuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae			stijve ogentroost, ogentroost	euphrase raide, euphrase glanduleuse, casse-lunettes	bovengrondse delen	parties aériennes		

Eurpe oleracea Mart.	Arecaceae		açaí	açaí	evernia, lichen de chêne, mousse de chêne	vrucht, zaad	fruit, graine		
Evernia prunastri (L.) Ach.	Parmeliaceae		eikmos, gewoon geweiños			thallus	thallus		
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.	Rubiaceae					schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Fabiana imbricata Ruiz & Pav	Solanaceae					hele plant	plante entière		
Fagopyrum esculentum Moench	Polygonaceae	Polygonum fagopyrum L.	gewone boekweit	sarrasin commun, blé noir		bovengrondse delen	parties aériennes		
Fagus sylvatica L.	Fagaceae		gewone beuk	hêtre commun		schors, knop, vrucht	écorce, bourgeon, fruit		
Fallopia japonica (Houtt.) Ronsé Dec.	Polygonaceae	Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.	Japanse duizendknoop	renouée du japon, reynouria du japon		hele plant	plante entière		
Ferula assa-foetida L.	Apiaceae		duivelsdrek	ase fétide		wortel, gomhars	racine, gomme-résine		
Ficus benghalensis L.	Moraceae		banyan	figuier des banians, banian de l'inde		schors, vrucht	écorce, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :

								bevatien : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ficus carica L.	Moraceae				vijg	figuier comestible	hele plant	plante entière	
Ficus religiosa L.	Moraceae				bodhiboom	figuier des pagodes, arbre de la bodhi, pipal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim	Rosaceae				moerasspirea, geitenbaard	reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc	bovengrondse delen	parties aériennes	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants

Filipendula vulgaris Moench.	Rosaceae			knolspirea	spirée filipendule	hele plant	plante entière	adolescenten onder 18 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	et adolescents de moins de 18 ans. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Foeniculum vulgare Mill.	Apiaceae			venkel	fenouil	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Oleaceae			forsythia	forsythia	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	Rosaceae			aardbei	fraiser	hele plant	plante entière		

Fragaria vesca L.	Rosaceae			fraisier sauvage, fraisier des bois	vrucht, blad	fruit, feuille		
Fragaria viridis Weston	Rosaceae		heuvelaardbei	fraisier des collines, fraisier vert	hele plant	plante entière		
Frangula alnus Mill.	Rhamnaceae	Frangula dodonei Ard., Rhamnus frangula L.	sporkenhout, vuilboom	bourdaine, frangule	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Frangula purshiana Cooper	Rhamnaceae	Rhamnus purshiana DC.	Cascara	cascara, écorce sacrée	schors	écorce	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als cascarioside A) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascarioside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Fraxinus excelsior L.	Oleaceae		gewone es	frêne commun	bovengrondse delen	parties aériennes		
Fraxinus ornus L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	blad, manna	feuille, manne		
Fucus serratus L.	Fucaceae		zaagwier	varech denté	thallus	thallus		

<i>Fucus vesiculosus</i> L.	Fucaceae		fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	thallus	thallus	
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveraceae		gewone duivekervel	funetere officinale	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Lamiaceae	<i>Galeopsis ochroleuca</i> Lam.	Bleekgele hennepnetel	galéopsis des champs, chanvre bâlard	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae		kleefkruid	gaillet gratteron, rièble, grateron, gratte-langue, gaille	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Galium mollugo</i> L.	Rubiaceae		glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Rubiaceae	<i>Asperula odorata</i> L.	lievevrouwebedstro	on la connaît aussi sous les noms de « rièble », « grateron », « gratte-langue », « gaille ».	Bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae		geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Garcinia × mangostana</i> L.	Clusiaceae		mangostan	mangoustanier	vrucht	fruit	
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb.	Clusiaceae	<i>Garcinia cambogia</i> (Gaertn) Desr.	Guttegomboom	guttier	gomhars	gomme-résine	
<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Rubiaceae	<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merr.	Gardenia	gardénie commun, jasmin du cap	hele plant	plante entière	
<i>Gastrodia elata</i> Blume	Orchidaceae				hele plant	plante entière	
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae		liggende bergthee	gauthérie du canada	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Gelidium amansii</i> J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus	

Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret	Gelidiaceae	agar agar	agar agar	agar agar	thallus	thallus	
Gentiana lutea L.	Gentianaceae		gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune	thallus	rhizome, racine	
Geranium maculatum L.	Geraniaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	
Geranium pratense L.	Geraniaceae		beemdoioievaarsb ek	géranium des prés	bovengrondse delen	parties aériennes	
Geranium robertianum L.	Geraniaceae		roberskruid	géranium herbe à robert	bovengrondse delen	parties aériennes	
Geranium sanguineum L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbe k	géranium sanguin, herbe à becquet	bovengrondse delen	parties aériennes	
Geum rivale L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	benoite des ruisseaux, benoite des ruisseaux	hele plant	plante entière	
Geum urbanum L.	Rosaceae		geel nagelkruid	benoite commune	hele plant	plante entière	
Ginkgo biloba L.	Ginkgoaceae		ginkgo	ginkgo, arbre des pagodes, arbre aux quarante écus	blad	feuille	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :

								gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.
Glycine max (L.) Merr.	Leguminosae	soja	soja		soja	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout		réglisse	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse

<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Malvaceae			behaarde katoen	coton mexicaïn	zaad	graine	detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat.	contient aucune quantité détectable en gossypol. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
<i>Gracilaria gracilis</i> (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham	Gracilariaceae			knoopwier		thallus	thallus		
<i>Grindelia camporum</i> Greene	Compositae			gomplant	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	Compositae	<i>Grindelia humilis</i> Hook & Ar.				Bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Compositae			grindelia	grindélia robuste	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Compositae			grindelia	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Guaiacum officinale</i> L.	Zygophyllaceae			guajakhout, echt pokhout	bois de gaïac	schors, hout	écorce, bois		
<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zygophyllaceae			guajakhout, pokhout	bois de gaïac	schors, hout	écorce, bois		
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamk.	Malvaceae				bois de hêtre, bois d'homme, bois d'orme	schors, blad, vrucht, zaad	écorce, feuille, fruit, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae	jiaogulan	jiaogulan, herbe de l'immortalité	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	pharmaciens en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae	pluimgipskruid	gypsophile paniculée	wortel	racine			
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcaceae	bloedregenalg	haematococcus pluvialis	éencellige alg	algue unicellulaire			
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae	campechehout	bois de campêche	ongefermenteerd kernhout	duramen non fermenté			
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae	virginische toverhazelaar	hamamélis de virginie	schors, blad	écorce, feuille			
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae			bovengrondse delen	parties aériennes			
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae	duivelsklauw	griffe du diable	secundaire wortelknol	tubercule secondaire	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une	

Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hédéome	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	lierre	blad	feuille	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemmin g met de volgende maximale dagelijkse dosis: a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent ethanol 24-30% m/m b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m d) vloeibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v; propylene glycol (98:2)	Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondante : a) extrait sec (DER 4-8 :1), solvant d'extraction éthanol 24-30% m/m b) extrait sec (DER 6-7 :1), solvant d'extraction éthanol 40% m/m c) extrait sec (DER 3-6 :1), solvant d'extraction éthanol 60% m/m d) extrait fluide (DER 1 :1), solvant d'extraction éthanol 70% v/v e) extrait mou (DER 2.2- 2.9 :1), solvant

<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench.	Compositae		strobloem, zandstrobloem	immortelle des sables	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don.	Compositae		kerriepiant	immortelle d'Italie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	immortelle stoechade	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Apiaceae		gewone berenklauw	berce commune	hele plant	plante entière		
<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae		kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière		
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Caryophyllaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Brassicaceae		damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée des dames, violette de damas, aragone	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazing	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine		
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae		muizenoor	epervière piloselle	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.	Poaceae	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Wahl.	veenreukgras	hierochloë odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		

Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		riemvier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Hippophae rhamnoides L.	Eleagnaceae		duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies			
Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao	hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus			
Hordeum vulgare L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zestrige gerst	incl. orge carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe			
Houttuynia cordata Thunb.	Saururaceae				hele plant	plante entière			
Humulus lupulus L.	Cannabaceae		hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescences		De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8- prenylharingenine hoger dan 400 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8- pénylharingénine supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	canadese geelwortel	hydraste du canada	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloides isoquinoliniques (exprimée en berbéine) supérieure à 10 mg.
<i>Hygrophila auriculata</i> (Schumacher) Heine	Acanthaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Leguminosaeae		lokusboom, gomcopal	courbaril	schors, fruit, blad, zaad, hars	écorce, fruit, feuille, graine, résine		
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hyperaceae		sint-janskruid	millepertuis perforé, millepertuis commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypericine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

								mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat.	progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.
Jasminum grandiflorum L.	Oleaceae						jasmin à grandes fleurs	bloem	fleur
Jasminum officinale L.	Oleaceae						jasmin commun	bloem	fleur
Jateorhiza palmata (Lam.) Miers	Menispermaceae						kolombo, calumbo	wortel	racine
Juglans cinerea L.	Juglandaceae						noyer cendré, noyer blanc, noyer à beurre	zaad	graine

<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae			noyer royal	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Jumellea fragrans</i> (Thouars) Schltr.	Orchidaceae				blad	feuille		
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae			genévrier commun	vrucht, blad, hout	fruit, feuille, bois	Voor voedingssupple menten met bereidingen van de vrucht : De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fruit : L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	malabarnoot, adulsa, arusa	noix de malabar	hele plant	plante entière		
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae		kentjoer		wortelstok	rhizome		
<i>Kavalama urens</i> (Roxb.) Raf.	Malvaceae	<i>Sterculia urens</i> Roxb.			gom	gomme		
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek	linaire bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Knaulia arvensis</i> (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon	knaulic des champs, scabieuse des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	Krameria triandra Ruiz & Pav.	ratanhia	ratanhia	wortel	racine		
Lactuca indica L.	Compositae		chinese sla		bovengrondse delen	parties aériennes		
Lactuca sativa L.	Compositae		sla	aitue, laitue cultivée, salade	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.	Lythraceae		banaba	lilas des indes, queens crape myrtle, banaba	blad	feuille		
Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae	Laminaria palmata Bory	gladgesteeld vingerwier	laminaire digitée	thallus	thallus		
Laminaria hyperborea (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vinger vier	laminaire hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus		
Laminaria japonica J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp	Laminaire	thallus	thallus		
Laminum album L.	Lamiaceae		witte dovenetel	lamier blanc	bovengrondse delen	parties aériennes		
Larix decidua Mill.	Pinaceae		europese lork, lork	mélèze d'europa, mélèze, mélèze commun	bovengrondse delen, hars	parties aériennes, résine		
Larix occidentalis Nutt.	Pinaceae		west amerikaanse lork	mélèze de l'ouest	hele plant	plante entière		
Laurus nobilis L.	Lauraceae		laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad	fruit, feuille		
Lavandula x intermedia Emery ex Loisel.	Lamiaceae		lavendel	lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lavandula angustifolia Mill.	Lamiaceae	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia,	lavendel	lavande	bloeiende top	sommités fleuries		

		Lavandula officinalis Chaix, Lavandula spica L.								
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea	Lamiaceae	Lavandula vera DC.	lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités fleuries				
Lavandula latifolia Medik	Lamiaceae	Lavandula hybrida E. Rev. ex Briq.	breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengrondse delen	parties aériennes				
Lavandula stoechas L.	Lamiaceae		franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon, lavande à toupet henné	bovengrondse delen	parties aériennes				
Lawsonia inermis L.	Lythraceae		henna		blad	feuille	Analyse moet antonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	Analyse moet demonstreren dat de preparatie ne houdt enige hoeveelheden detecteerbare naftochinonen.		
Ledum palustre L.	Ericaceae		moerasrozemarijn ; moeraspalm	lédum, lédum des marais	bovengrondse delen	parties aériennes				
Lens culinaris Medik.	Leguminosae		linze	lentille cultivée	zaad	graine				
Leonurus cardiaca L.	Lamiaceae		hartgespan	agripaume	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij	L'etiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage		

Leonurus japonicus Houtt.	Lamiaceae	Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu, Leonurus heterophyllus Sweet					bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	concomitant de traitement contre l'hypertension. L' étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Brassicaceae		veldkruiders	passerage champêtre			bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.	L' étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la	
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae						bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Pour les personnes en hypothyroïdie of onder	L' étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la	

Lespedeza capitata Michx.	Leguminosae		lespedeza	lespedeza	bovengrondse delen	parties aériennes		
Leucantherum vulgare (Vall.) Lam.	Compositae		gewone margriet	marguerite, marguerite commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Levisticum officinale W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	céleri perpétuel, livèche, herbe-à-maggi	hele plant	plante entière		
Ligusticum striatum DC.	Apiaceae	Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch.			wortel	racine	Het gehalte aan alkaloiden moet worden bepaald. Bij gebruik van de essentiële olie moet het gehalte aan progestogenen bepaald worden. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La teneur en alcaloïdes doit être déterminée. En cas d'utilisation de l'huile essentielle, la teneur en progestagènes doit être déterminée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Lilium brownii F.E. Br. ex Mieliez	Liliaceae				bol	bulbe	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	racine		
Linum usitatissimum L.	Linaceae		gekweekt vlas	lin cultivé	zaad	graine		

Liquidambar styraciflua L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	copalme d' amérique	schors	écorce		
Litchi chinensis Sonn.	Sapindaceae		lychee	litchi, litchi	vrucht, zaad	fruit, graine		
Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug	Hapaliaceae	Phymatolith on calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L. McKibb in ex Woelkerling & L.M. Irvine.	lithothamnion calcareum	lithothamne	thallus	thallus		
Litsea cubeba (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobariaceae		longenmos	pulmonaire	thallus	thallus	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliaceae		japanse kamperfoelie	chèvrefeuille du japon	bloem, steel	fleur, tige		
Lotus corniculatus L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant	plante entière		
Lotus corniculatus	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	bovengrondse delen	parties aériennes		

								volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Lysimachia vulgaris L.	Primulaceae			grote vederik	lysimaque commune, grande lysimaque	bovengrondse delen	parties aériennes		
Lythrum salicaria L.	Lythraceae			grote kattenstaart	salicaire commune	toppen	sommités	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Macadamia ternifolia F. Muell	Proteaceae			macadamianoten	noyer du queensland	vrucht, zaad	fruit, graine		
Macrocystis pyrifer (L.) C.Ag.	Laminariaceae			kelp	kelp	thallus	thallus		
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae				Michelia champaca L.	bloem	fleur		

Magnolia officialis Rehder & Wilson	Magnoliaceae		magnolia	magnolia official	schors, bloem	écorce, fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheeker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Malpighia glabra L.	Malpighiaceae	Malpighia punicifolia L.	west-indische kers, barbadoskers	cerise de barbade, acérola	vrucht	fruit		
Malus domestica Borkh.	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf	ceetappel	pommier commun	hele plant	plante entière		
Malus pumila Mill.	Rosaceae		paradijsappelboom	pommier paradis	knop, bloem, vrucht blad	bourgeon, fleur, fruit feuille		
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris	Rosaceae		wilde appel	pommier sauvage	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon, fleur, fruit feuille		
Malva sylvestris L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	mauve sauvage, fromageon, petit fromage, fonassier	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mammea americana L.	Calophyllaceae		amerikaanse mammi-appel	abricotier des antilles, abricotier-pays	pulp van de vrucht	pulpe du fruit		
Mangifera indica L.	Anacardiaceae		mango	manguier	hele plant	plante entière		

Manihot esculenta Crantz	Euphorbiaceae		cassave, maniok	manioc	gekookte wortel	racine cuite		
Manilkara zapota (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapotillier	vrucht, bloem	fruit, fleur		
Maranta arundinacea L.	Marantaceae		pijlwortel	marante, dictame, herbe aux flèches	bol, wortelstok	buble, rhizome		
Marchantia polymorpha L.	Marchantiaceae		parapluijesmos	hépatique des fontaines	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hitebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Marrubium vulgare L.	Lamiaceae		malrove	marrube	bovengrondse delen	parties aériennes		
Marsdenia cundurango Rechb.f.	Apocynaceae	Marsdenia reichenbachii i Triana	condurango	condurango	schors	écorce		
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	Gynemna sylvestris (Retz) R.Br.			blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry	Phyllophoraceae		kernwier		thallus	thallus		

Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert	echte kamille	matricaire camomille, camomille vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupple- menten met bereidingen van de bloem of het blad : De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van α -bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7- glucoside hoger dan 5,6 mg.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d' α - bisabolol supérieure à 1,9 mg et d'apigénine-7- glucoside supérieure à 5,6 mg.
Medicago sativa L.	Leguminosae		luzerne, alfalfa	luzerne commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Melaleuca alternifolia (Maiden & Bertche) Cheel	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirthehei	melaleuca, arbre à thé, mélealeque	bovengrondse delen	parties aériennes	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupple menten.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajeputboom	cajeputier	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupple menten.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca leucadendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendro n (L.) L.			blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupple menten.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca linariifolia Sm.	Myrtaceae			melaleuke à feuilles linéaires	blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupple menten.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	niaouli	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupple menten.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina, l'arbre à peau	blad twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet	L'huile essentielle de cette plante n'est

Mesembryanthemum crystallinum L.	Aizoaceae	Gasoul crystallinum (L.) Rothm.; Cryophytum crystallinum (L.) N.E.Br.	ijsplantje, ijskruid	ficoïde glaciële	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloiden hoger dan 90 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes de type mesembrine supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Mespilus germanica L.	Rosaceae		mispel	néflier, néflier commun	vrucht	fruit		
Mikania amara (Vahl) Willd.	Compositae				schors, blad	écorce, fruit		
Mitchella repens L.	Rubiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Momordica balsamina L.	Cucurbitaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Momordica charantia L.	Cucurbitaceae		alsenpeer, balsenpeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer	concombre amer, margose	vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Monarda didyma L.	Lamiaceae		bergamot, scharlakken monarda	monarde pourpre, thé d'oswego	bovengrondse delen	parties aériennes		
Monarda punctata L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Morinda citrifolia L.	Rubiaceae		noni, indische moerbeï	noni, pomme-chien	puree en concentraat van vrucht, sap	purée et concentré de fruit, jus	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Morinda officinalis F.C. How	Rubiaceae				hele plant	plante entière		
Moringa oleifera Lam.	Moringaceae		moringa	moringa	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité

								500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar.	équivalente à 500 mg de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer aux enfants de moins de 18 ans.	
Morus alba L.	Moraceae							fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Morus nigra L.	Moraceae							knop, steel, schors, vrucht, blad	bourgeon, tige, écorce, fruit, feuille	
Murraya koenigii (L.) Spreng.	Rutaceae							schors, blad, wortel van de volwassen struik	écorce, feuille, racine d'un buisson adulte	
Musa x paradisiaca L. (pro sp.)	Musaceae							vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine	

Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	Psidium dubium H.B.K.	camu camu, rumbes	camu camu, caçari, camo	vrucht	fruit		
Myrica cerifera L.	Myricaceae			arbre à sulf, appelé citier, arbre à cire	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Myrica gale L.	Myricaceae		wilde gage, was gagel	piment royal, myrte des marais, bois-sent-bon, myrique baumier	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Myristica fragrans Houtt.	Myristicaceae		nootmuskatboom	muscadier	foelie, zaad	macis, graine		
Myroxylon balsamum var. balsamum (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	baumier de tolu	schors van de stam	écorce du tronc		
Myrtus communis L.	Myrtaceae		mirt	myrte	bovengrondse delen	parties aériennes		
Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	Nardostachys grandiflora DC.	jatamansi, indisch aardborstelgras, narduskruid	jatamansi, nard indien	hele plant	plante entière		

Nasturtium officinale R. Brown	Brassicaceae		witte waterkers	cresson de fontaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de pulegone supérieure à 3,5 mg.
Nelumbo nucifera Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, lotus des indes, lotus sacré.	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Nepeta cataria L.	Lamiaceae		wild kattenkruid	herbe aux chats	bovengrondse delen	parties aériennes		
Nepeta tenuifolia Benth.	Lamiaceae	Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	chataïre japonaise	blad	feuille		
Nephelium lappaceum L.	Sapindaceae		ramboetan	ramboutan, litchi chevelu	vrucht	fruit		
Nigella sativa L.	Ranunculaceae		zwarte komijn	nigelle cultivée, cumin noir	koud geperste olie van het zaad	huile de la graine pressée à froid	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude persing is	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à haute dose ne

Ocimum basilicum L.	Lamiaceae							instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name: kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	convient pas pour la consommation par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.
							parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae						parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommandée ne doit pas

Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae	Ocimum sanctum L.	heilige basilicum	basilic sacré	hele plant	plante entière	<p>een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.</p>	<p>conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.</p>
							<p>De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.</p>	<p>La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.</p>

Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae		watertorkruid, watervinkel	oenanthe phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique	rijpe vrucht	fruit mûr		
Oenothera biennis L.	Onagraceae		middelste teunisbloem	onagre bisanuelle	zaad	graine		
Olea europaea L.	Oleaceae		olijfboom	olivier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae		olijfboom	olivier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Ononis spinosa L.	Leguminosae	Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"	kattedoorn	bugrane épineuse, arrête- bœuf	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc componenten i) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams	Leguminosae	Ononis arvensis L.	wild zoethout, stalkruid	bugrane des champs	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc componenten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du

								composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.	t) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.
Onopordon acanthium L.	Compositae				wegdistel	chardon aux ânes, onopordon fausse-acanthe	bovengrondse delen	parties aériennes	
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae				japanse slangenbaard	barbe de serpent, muguet du japon	knol	tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.
Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae				opopanax	opopanax, opopanax de chiron	hele plant, gomhars	plante entière, gomme-résine	
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactaceae				vijgcactus	oponce, figuier de barbatie	cladode, bloem, vrucht	cladode, fleur, fruit	
Orchis mascula L.	Orchidaceae				mannetjesorchis	orchis mâle	wortelknol	tubercule	
Origanum compactum Benth	Lamiaceae				origano	origan	bovengrondse delen	parties aériennes	
Origanum dictamnus L.	Lamiaceae				hopmarjolein, kandische majoraan	dictame de crête	bovengrondse delen	parties aériennes	

<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae	<i>Majorana hortensis</i> Moench.	marjolein, majoraan	marjolaine, amarique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae		wilde marjolein, oregano	origan, origan vulgaire, marjolaine sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	Lamiaceae		javanse nierthee	thé de java, moustaches de chat	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5,5 g de feuilles séchées.
<i>Orthosiphon aristatus</i> var. <i>aristatus</i>	Lamiaceae		kattensnor	moustaches de chat	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Oryza sativa</i> L.	Poaceae		rijst	riz	zaad, wortel	graine, racine		
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae		witte klaverzuuring	oseille des bois	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Malvaceae		watercacao	marce, noisetier de la guyane, noix de malabar, arbre à monnaie	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Malvaceae				zaad	graine		
<i>Padus avium</i> var. <i>avium</i>	Rosaceae	<i>Prunus padus</i> L.	gewone vogelkers	cerisier à grappes, merisier à grappes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van waterstofcyanide equivalenten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en

<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	Paeoniaceae	<i>Paeonia albiflora</i> Pall., <i>Paeonia chinensis</i> L. Vilmorin	chinese pioen	pivoine blanche, pivoine commune	bloem, wortel, zaad	fleur, racine, graine	(vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Paeoniaceae		boerenpioen	pivoine officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
<i>Paeonia x suffruticosa</i> Andrews	Paeoniaceae		boompioen	pivoine en arbre	wortel	racine		
<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmaraceae	<i>Fucus palmatus</i> L., <i>Rhodymenia palmata</i> (L.) Greville	rood lapwier	rhodyménie palmé	thallus	thallus		
<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	Araliaceae		ginseng	ginseng, mandragore coréenne	wortel, blad, bes	racine, feuille, baie	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax pseudoginseng Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax quinquefolius L.	Araliaceae			ginseng américain	wortel, blad, zaad	racine, feuille, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement

<i>Panicum miliaceum</i> L.	Poaceae		pluimgierst		millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit		contre le diabète.
<i>Panzerina lanata</i> (L.) Soják	Leguminosae	<i>Panzeria lanata</i> (L.) Bunge.				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae		grote klaproos		grand coquelicot	bloem	fleur		
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Urticaceae		groot glaskruid		pariétaire officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae					thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	<i>Ampelopsis tricuspidata</i> Siebold et Zucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd		vigne-vierge à trois pointes	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de jeune pousse: La portion journalière recommandée

											ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
Passiflora edulis Sims	Passifloraceae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes	een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant.				
Pastinaca sativa L.	Apiaceae		pastinaak	panais	wortel	racine					
Paulinia cupana Kunth	Sapindaceae		guarana	guarana	zaad	graine					
Pedaliium murex L.	Pedaliaceae				bovengrondse delen	parties aériennes					
Pelargonium graveolens L'Herit	Geraniaceae		rozenpelargonium , rozengeranium	pélargonium à forte odeur	bovengrondse delen	parties aériennes					
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniaceae	Pelargonium radula (Cav.) L'Her.			bovengrondse delen	parties aériennes					
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	zaad	graine					
Persea americana Mill.	Lauraceae		avocado-boom	avocatier	blad, olie van het vruchtvlees	feuille, huile de la pulpe du fruit					
Pericaria bistorta (L.) Samp.	Polygonaceae	Polygonum bistorta L.	adderwortel, adderkruid	bistorte, renouée bistorte, serpentaïre, feuiltote	wortelstok	rhizome					
Pericaria maculosa Gray	Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	perzikkruid	renouée persicaire	bovengrondse delen	parties aériennes					
Peperiveria alliacea L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruid	herbe aux poules	blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing				L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

									bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangerschap.	utliser en cas de grossesse.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae			tuinpeterselie		persil cultivé	hele plant	plante entière		
Peucedanum ostruthium (L.) W. Koch	Apiaceae			meesterwortel, varkenskervel		impératoire, peucedan officinal	hele plant	plante entière		
Peumus boldus Molina	Monimiaceae			boldo		boldo	blad	feuille		
Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae			gewone boon		haricot commun	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		
Phellodendron amurense Rupr.	Rutaceae			kurkboom		phellodendron de l'amour, arbre au liège	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoliniques supérieure à 10 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phillyrea latifolia L.	Oleaceae					alavert à larges feuilles	blad	feuille		
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	Polypodiaceae			blauwvaren			blad, wortelstok	feuille, rhizome		

Phoenix dactylifera L.	Araceae		dadelpalm	palmier dattier, dattier	vruchtvlees	pulpe du fruit		
Phoenix melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	Aronia melanocarpa (Michaux.) S. Elliott	zwarte appelbes	amélanchier à fruits noirs, aronie à fruits noirs	vrucht	fruit		
Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	Lippia dulcis Trev.	azteeks zoetkruid	l'herbe sucrée des Azèques	bovengrondse delen	parties aériennes		
Phyllanthus amarus Schumacher. & Thonn.	Phyllanthaceae				bloeiende top	Sommités fleuries	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus emblica L.	Phyllanthaceae	Emblica officinalis Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, arbre de malacca	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus niruri L.	Phyllanthaceae				hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zvangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phymatolithon calcareum (Pallas)	Haplidiaceae			lithothamne	thallus	thallus		

W.H.Adey & D.L.McKibbin									
Physalis alkékengi L.	Solanaceae				coqueret, coqueret alkékengi, lanterne chinoise	rijpe vrucht	fruit mûr		
Physalis peruviana L.	Solanaceae				goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	rijpe vrucht	fruit mûr		
Picea abies (L.) Karst.	Pinaceae				epicéa commun, epicéa, faux sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge	naald, top van de tak	aiguille, bout de branche		
Picramnia antidesma Sw.	Picramniaceae					schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de

<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, oliehart, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	schors, knop, vrucht, blad, scheut	écorce, bourgeon, fruit, feuille, pousse		
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	maticopeper	matico	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		lange peper	poivre long	vrucht	fruit		
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	vrucht, oliehart, olie	fruit, oléorésine, huile		
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	<i>Lentiscus vulgaris</i> Fourr., <i>Terebinthus lentiscus</i> (L.) Moench	mastiekboom	lentisque, pistachier lentisque	blad, hars, twijg	feuille, résine, brindille		
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Anacardiaceae		terpentijnboom	pistachier térébinthe, térébinthe	vrucht	fruit		
<i>Pistacia vera</i> L.	Anacardiaceae		pistache, pimpermoot	pistachier pistachier commun, pistachier cultivé, pistachier vrai	vrucht	fruit		
<i>Pisum sativum</i> L.	Leguminosae		erwt	pois	peul, zaad	gousse, graine		
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i> L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium, plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier	zaadhuid, zaad	tégument de graine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment

									bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Plukenetia volubilis L.	Euphorbiaceae						olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	Lamiaceae						blad	feuille		
Polygala senega L.	Polygalaceae						senegawortel, senecawortel, ratslangwortel	polygala de virginie, sénega, laitier, herbe au lait	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala sibirica L.	Polygalaceae						wortel	racine	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter l'avertissement

<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	Polygalaceae						polygala de chine	wortel	racine	waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae					Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesbloem	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Liliaceae					<i>Polygonatum officinale</i> All.	welriekende salomonszegel	wortelstok	rhizome		
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Asparagaceae						varkensgras	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae						witte abeel, zilverpopulier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus balsamifera L.	Salicaceae		balsempopulier	peuplier baumier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus nigra L.	Salicaceae		zwarte populier	peuplier noir	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremula L.	Salicaceae		ratelpopulier	peuplier tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en

									cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Rosaceae				tormenti, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid	tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe de sainte catharine	hele plant	plante entière	gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding
Potentilla reptans L.	Rosaceae				vijfvingerkruid	potentille rampante, quintefeuille	wortelstok	rhizome	
Prangos pabularia Lindl.	Apiaceae				prangos	yugan	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Primula elatior Hill	Primulaceae				slanke sleutelbloem	primevère élevée, primevère des bois	bloem, wortel	fleur, racine	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Primula veris L.	Primulaceae			Primula officinalis (L.) Hill.	gulden sleutelbloem	primevère officinale	bloem, wortel	fleur, racine	

Prunella vulgaris L.	Lamiaceae		gewone brunel	brunelle commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.
Prunus africana (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum africanum Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	mueri, pygeum, prunier d'afrique	schors	écorce		
Prunus armeniaca L.	Rosaceae		abrikooos	abricotier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus avium (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	merisier, cerisier des oiseaux, cerisier, bigarreautier	vrucht, steel	fruit, pédoncule		
Prunus cerasus L.	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	zure kers	griottier	Fruit (namelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom	Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule, feuille, écorce, gomme		
Prunus domestica L.	Rosaceae		pruinboom	prunier	schors, knop, bloem, vrucht, blad	écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille		
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Batsch.	amandelboom	amandier	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bourgeon, bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié)

<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Rosaceae			perzik	pécher, pécher commun	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		supérieure à 5 mg.
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae			amerikaanse vogelkers	cerisier tardif	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae			sleedoorn	prunellier, epine noire, prunier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae			guava	goyavier	schors, vrucht, blad, wortel	écorce, fruit, feuille, racine	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.
<i>Psidium</i> guineense Sw.	Myrtaceae		<i>Psidium</i> <i>araca Raddi</i>	braziliaanse guave	goyavier du Brésil	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Pterocarpus</i> erinaceus Poir.	Leguminosae				vène	sap van het hout	jus du bois		
<i>Pterocarpus</i> indicus Willd.	Leguminosae					sap van het hout	jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Pterocarpus</i> marsupium Roxb.	Fabaceae			kinoboorn, sandelboom, bastaardteak	kino de malabar	bloem, kernhout, blad, gomhars	fleur, duramen, feuille, gomme- résine		

Pterocarpus officinalis Jacq.	Leguminosae	Pterocarpus draco L.			hars	résine		
Pterocarpus santalinus L. f.	Leguminosae		rode sandelboom	santal rouge	hout	bois		
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	kudzu	kudzu	bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.	Leguminosae				bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour

Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.	Compositae					hele plant	plante entière		chaque lot de produits.
Pulmonaria officinalis L.	Boraginaceae					wortel	racine	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalt en aan bepaalde verontreiniginge n in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossie r dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.
Punica granatum L.	Lythraceae					bloem, vrucht, zaad	fleur, fruit, graine		

Pyrola rotundifolia L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig wintergroen	pyrole à feuilles rondes	blad	feuille		
Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	Porphyra tenera Kjellman			thallus	thallus		
Pyrus communis L.	Rosaceae		peer	poirier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Quercus alba L.	Fagaceae		amerikaanse witte eik	chêne blanc, chêne blanc d'amérique	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus coccifera L.	Fagaceae		hulsteik	chêne des garrigues, chêne kermès	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus ilex L.	Fagaceae		steeneik	chêne vert, yeuse	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus infectoria G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Fagaceae		winterreik	chêne sessile	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus pubescens Willd.	Fagaceae		donzige eik	chêne pubescent, chêne blanc	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus robur L.	Fagaceae		zomereik	chêne pédonculé	schors, vrucht,	écorce, fruit, noix de		

<i>Quercus serrata</i> subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	<i>Quercus glandulifera</i> Blume	chinese eik	chêne à feuilles de châtaignier	galnoot, blad, bladknop	galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae		kurkeik	chêne-liège, corcier, suriet, suv	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae	<i>Quillaja smegrader</i> mos DC.			schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.) J.Kern.	knophenik, wilde radijs	ravenelle, radis ravenelle, radis sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae		tuinradijs	radis cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	<i>Raphia pedunculata</i> P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	amidon de la moelle de la pousse		
<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		chinees vingerhoedskruid	digitale de chine, rehmannia	wortel	racine		
<i>Reynoutria multiflora</i> (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb., <i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	renouée à fleurs multiples	wortel, stengel, zaad	racine, tige, graine		
<i>Rhamnus alpina</i> L.	Rhamnaceae		alpenwegedoorn	nerprun des alpes	schors	écorce	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides

Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae	Tuinrubarber	rhubarbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	<p>moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.</p>	<p>résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.</p>	<p>La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.</p>
-------------------------------	--------------	--------------	----------	-----------------------	--------------------	--	---	--

Rheum officinale Baill.	Polygonaceae						volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
		chinese rabarber	rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale	wortel, wortelstok	racine, rhizome		De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de

Rheum palmatum L.	Polygonaceae			chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder	zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies..	moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
								La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation		

Rheum rhabarbarum L.	Polygonaceae	Rheum undulatum L.	rabarber	rhubarbe des jardins	wortel, wortelstok	racine, rhizome	deskundig advies.	prolongée sans avis d'un spécialiste.
							De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rheine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhaponticum L.	Polygonaceae				wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée

							niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae	rozewortel	orpin rose	wortel	racine			
Ribes nigrum L.	Grossulariaceae	zwarte aalbes	grosellier noir, cassis, cassissier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille			
Ribes rubrum L.	Grossulariaceae	aalbes, trosbes	grosellier à grappes	vrucht, blad	fruit, feuille			

Ribes uva-crispa L.	Grossulariaceae			groseillier épineux, groseillier à maquereau	vrucht, blad	fruit, feuille		
Robinia pseudoacacia L.	Leguminosae		gewone robinia, valse acacia	robinier faux-acacia	gekookte bloem, gekookte zaad	fleur cuite, graine cuite		
Rocella phycopsis Ach.	Rocellaceae	Rocella tinctoria DC.			thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	rosier des chiens, églantier commun	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa x-centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos, provenceroos	rosier cent-feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feuille		
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	rosier de france, rosier de provins	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskustroos	rosier musqué	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		eglantier	rosier rouillé, rosier rubigineux, rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille		
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f.	damastroos	rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille		

Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae	trigintipetala Dieck	rozemarijn	romarin	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia L.	rubiaceae	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lucidine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.
Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	ronce bleue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	ronce commune, ronce des buissons, murier sauvage	hele plant	plante entière		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	framboisier commun, framboisier	blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	feuille, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonaceae		veldzuring	oselle sauvage, oselle des prés, oselle, oselle commune	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux*

Rumex acetosella L.	Polygonaceae							rhéine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	(exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
								De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être
								plante entière	
								hele plant	
								petite oselle	
								schapenzuring	

Rumex alpinus L.	Polygonaceae							producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
							plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluwenzuring	patience agglomérée	hele plant	plante entière	toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
							De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas

Rumex crispus L.	Polygonaceae							Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
								De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uigedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex longifolius DC.	Polygonaceae				hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhein) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex obtusifolius L.	Polygonaceae		ridderzuring	patience à feuilles obtusées, patience sauvage, rumex à feuilles obtusées	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

Rumex patientia L.	Polygonaceae								anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
		patience des moines, oseille épinard	spinaiezuring	hele plant	plante entière				De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats

									waarschuwingen. bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae		stekelige muizendoorn	fragon, petit houx	hele plant	plante entière			De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Ruscus hypoglossum L.	Asparagaceae				cladode, wortelstok	cladode, rhizome			De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae				bovengrondse delen	parties aériennes				
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders	Laminariaceae	Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.	suikervier	laminaire sucrée, baudrier de neptune	thallus	thallus				

Saccharum officinarum L.	Poaceae		suikerriet	canne à sucre	tak, sap	branche, jus	
Salix alba L.	Salicaceae		schierwilg, knotwilg	saule blanc	schors, knop, bloem, blad	écorce, bourgeon, fleur, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.
							La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix caprea L.	Salicaceae		bosvilg	saule marsault, saule des chèvres, marsaule, marseau	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen
							La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

Salix fragilis L.	Salicaceae								<p>bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.</p>	<p>avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.</p>
								<p>écorce, feuille</p>	<p>De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.</p>	<p>La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.</p>

Salix pentandra L.	Salicaceae			laurierwilg	saule laurier, saule à cinq étamines	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix purpurea L.	Salicaceae			bittere wilg	osier rouge, saule pourpre	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

									bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salvia hispanica L.	Lamiaceae				chia	chia	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredi- ënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Salvia miltiorrhiza Bunge	Lamiaceae					rode salie	blad, wortel	feuille, racine		
Salvia officinalis L.	Lamiaceae					echte salie	bovengrondse delen	parties aériennes		
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Garns	Lamiaceae	Salvia lavandulifoli- a Vahl				lavendelsalie	bovengrondse delen	parties aériennes		
Salvia pratensis L.	Lamiaceae					veldsalie, weidesalie	bovengrondse delen	parties aériennes		

Salvia sclarea L.	Lamiaceae		scharlei	sauge sclarée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sambucus nigra L.	Adoxaceae		gewone vlier	sureau noir, sureau commun	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Sanguisorba minor Scop.	Rosaceae		kleine pimpernel	petite pimprenelle	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sanguisorba officinalis L.	Rosaceae		grote pimpernel	sanguisorbe officinale, grande pimprenelle	hele plant	plante entière		
Sanicula elata Buch.-Ham. ex D. Don	Apiaceae	Sanicula europaea L.	heelkruid	sanicle, sanicle d'Europe	blad, wortel	feuille, racine		
Santolina chamaecyparissus L.	Asteraceae		heiligenbloem	santale petit cyprès	bloeiende top, blad, zaad	sommité fleurie, feuille, graine		
Saponaria officinalis L.	Caryophyllaceae		zeepkruid	saponaire officinale	hele plant	plante entière		
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk	Apiaceae	Siler divaricatum (Turcz.) Benth. & Hook. f.		racine de silère	wortel	racine		
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach	Rosaceae	Poterium spinosum L.		racine de silère	wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre

								Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell	Sargassaceae	Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	hiziki, hiziki	hiziki	thallus	thallus			
Sarracenia purpurea L.	Sarraceniaceae		paarse trompetbekerplant	sarracénie pourpre	blad, wortelstok	feuille, rhizome			
Satureja hortensis L.	Lamiaceae		bonenkruid	sarriette commune, sarriette, sarriette des jardins	bloeiende top, zaad	sommité fleurie, graine			
Satureja montana L.	Lamiaceae		winterbonenkruid, bergbonenkruid, bergsteentijm	sarriette des montagnes, sarriette vivace	bovengrondse delen	parties aériennes			
Satureja thymbra L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes			
Saussurea costus (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	Saussurea lappa (Decne.) Sch. Bip.	costus	costus	wortel	racine			
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	Schisandraceae		schisandra, wu wei zu	schisandra de chine	decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	décoction de branche, jeune feuille cuite, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage	

Senna italica Mill.	Leguminosae	Cassia italica (Mill.) F.W.Andrew s					angustifolia (Vahl) Batka.	volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
								De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia obtusifolia L.							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
			hele plant	plante entière					De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans

Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosae				faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâlard, casse-puante	blad	feuille	deskundig advies. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	avis d'un spécialiste. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae					blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommandée ne doit pas

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz.	Taxodiaceae						een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
							Enkel geglycerineerde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevelen dagelijkse dosis overeenstemt met maximum	Seuls sont autorisés les macérats froids glycérinés pour lesquels la dose journalière recommandée correspond à maximum 41 mg
							jeunes pousses feuillées	
							jeune bebladerde scheuten	
							séquoia géant	
							mammoetboom	

Serenoa repens (W.Bartram) Small	Arecaceae	Serenoa serrulata (Michx.) G. Nicholson ; Serenoa serrulata (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks ; Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.	zaagpalm, zaagpalmetto	sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord	vrucht	fruit	41 mg equivalent droge plant.	d'équivalent plante sèche.
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae	Sesamum orientale L.	sesam	sésame	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.
Seseli tortuosum L.	Apiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Sideritis scardica Griseb.	Lamiaceae		Grieks bergkruid, Griekse bergthee	Grecque The de Montagne, herbe de fer Grec, the du mont Olympe	bovengrondse delen	parties aériennes	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (20%) est autorisée.
Sideritis syriaca L.	Lamiaceae		bergthee	Thé Grec des Montagnes	bovengrondse delen	parties aériennes	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (20%) est autorisée.

<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	<i>Sigesbeckia serrata</i> DC.		herbe grasse, herbe divine, herbe saint-paul	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Silaum silaus</i> (L.) Steud.	Apiaceae		weidekervel	silais des prés	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	chardon-marie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	graine sans huile	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.
<i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	gewone raket	sisymbre officinal, herbe aux chantes, vélar	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve steroïde glycoside bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en glycosides stéroïdes cardiotoniques.
<i>Smilax aristolochifolia</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schltdl. et Cham.			wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae		struikwinde, steke winde	salsepareille d'Europe	wortelstok, wortel, wortelscheut	rhizome, racine, pousse de racine		
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		chinawortel	squine	hele plant	plante entière		

<i>Smilax cordifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae					wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae					wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae	<i>Smilax</i> <i>tonduzii</i> Apt	echte sarsaparilla	salsepareille		wortel	racine		
<i>Smilax purhampuy</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax</i> <i>febrifuga</i> Kunth	ecuadoriaanse sarsaparilla		<i>smilax febrifuga</i> kunth	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax regelii</i> Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	salsepareille, salsepareille du honduras		wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Solanum</i> <i>melongena</i> L.	Solanaceae	<i>Solanum</i> <i>ovigerum</i> Dun.	aubergine	aubergine		vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Solanum</i> <i>tuberosum</i> L.	Solanaceae		aardappel	pomme de terre		knol	tubercule		
<i>Solidago</i> <i>virgaurea</i> L.	Compositae		echte guldenroede	solidage verge d'or		bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	sorbier des oiseleurs		bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorgho commun		zaad, jonge scheut	graine, jeune pousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Spatholobus</i> <i>suberectus</i> Dunn.	Leguminosae					stam	tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée

									niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponenten t) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae				rode schijnspurrie	spergulaire rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Amaranthaceae				spinazie	epinard	blad	feuille		
<i>Spirulina major</i> Kützing ex Gomont	<i>Pseudanabaena</i> ceae	<i>Spirulina major</i> Kützing			<i>spirulina</i>	<i>spiruline</i>	ééncellige alg	algue unicellulaire		
<i>Spirulina maxima</i> (Setchell & Gardner) Geitler	<i>Pseudanabaena</i> ceae	<i>Arthrospira maxima</i> Setchell & Gardner			<i>spirulina</i>	<i>spiruline</i>	ééncellige alg	algue unicellulaire		

Turnera diffusa Wild. ex Schult.	Passifloraceae		damiaanblad, damiana	feuilles de damiana, turnéra	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijkijdig gebruik van antidiabetische behandeling,	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ulmus glabra Huds.	Ulmaceae	Ulmus campestris L.; Ulmus scabra Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop	écorce, bourgeon		
Ulmus pumila L.	Ulmaceae		sibetische iep	orme de sibérie	schors, blad	écorce, feuille		
Ulmus rubra Muhl.	Ulmaceae	Ulmus fulva Michx.	rode iep	orme rouge	schors	écorce		
Ulm lactuca L.	Ulvaceae		zeesla	laitue de mer	thallus	thallus		
Uncaria gambir (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou gambir, arbre catechu	bovengrondse delen	parties aériennes		
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	Nauclea rhynchophyll la Miq.			haak	crochet		
Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	griffe de chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine		
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar	Alariaceae	Alaria pinnatifida Harvey	wakame	wakamé	thallus	thallus		
Urtica dioica L.	Urticaceae		grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupple	Pour les compléments

Urtica urens L.	Urticaceae							<p>menten met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.</p>	<p>alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.</p>
								<p>Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met</p>	<p>Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la</p>
								<p>plante entière</p>	
								<p>hele plant</p>	
								<p>ortie brûlante, petite ortie</p>	
								<p>kleine brandnetel</p>	

Usnea plicata Wiggers	Parmeliaceae						thallus	thallus	mag niet meer dan 3% zijn.	fini ne peut pas dépasser 3 %.
Vaccinium myrtilloides Michx.	Ericaceae	Vaccinium angustifolium var. myrtilloides (Michx.) House				airelle fausse-myrtille, bleuet, bleuet sauvage	vrucht, blad		De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Vaccinium corymbosum L.	Ericaceae		blauwe bes			myrtille arbutive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuet géant, corymbelle	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium macrocarpon Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry			canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits	bes	baie		
Vaccinium myrtilloides L.	Ericaceae		blauwe bosbes			myrtille commune, myrtille, baies de myrtille	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium oxycoccos L.	Ericaceae	Oxycoccus palustris Pers.	kleine veenbes			canneberge des marais, airelle canneberge,	vrucht	fruit		

Valeriana officinalis L.	Caprifoliaceae			echte valeriaan	valériane officinale, valériane des collines, valériane à petites feuilles	ondergrondse delen	parties souterraines	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde ondergrondse delen. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g des parties souterraines séchées. La forme finale à consommer ne peut pas contenir de valepotriates.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	Valeriana locusta L.	veldsla, korensla, ezelsoor	mâche, blanchette, boursette, clairette, raiponce, oreillette, salade de blé	blad	feuille			
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.	Orchidaceae		vanille-orchidee	vanille	vrucht, oliehar	fruit, oléorésine			
Verbascum densiflorum Bertol.	Scrophulariaceae		stalkaars	bouillon blanc à grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène	bovengrondse delen	parties aériennes			
Verbascum phlomoides L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	molène faux-phlomis	bloem	fleur			

Verbasum thapsus L.	Scrophulariaceae		koningskaars	bouillon blanc à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Verbena officinalis L.	Verbenaceae		ijzerhard	verveine sauvage, verveine officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Veronica anagallis-aquatica L.	Plantaginaceae		blauwe waterereprijs	véronique mouron d'eau, mouron aquatique	hele plant	plante entière		
Veronica beccabunga L.	Plantaginaceae		beekpunge	véronique des ruisseaux, cresson de cheval, salade de chouette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Veronica chamaedrys L.	Plantaginaceae		gewone ereprijs, gamander-ereprijs	véronique petit- chêne, fausse germandrée	hele plant	plante entière		
Veronica officinalis L.	Plantaginaceae		mannetjesereprijs	véronique officinale, thé d'Europe	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viburnum lantana L.	Adoxaceae		wollige sneeuwbal	viorné mancienne, viorné lantane, mancienne	bovengrondse delen	parties aériennes		
Viburnum opulus L.	Adoxaceae		gelderse roos	viorné obier, boule-de-neige	bovengrondse delen	parties aériennes		
Vicia faba L.	Leguminosae		tuinboon, labboon	feves, feverolles	gekookt zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.

<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	Phaseolus chrysanthos Savi	adzuki-boon	haricot azuki	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée	
<i>Viola calcarata</i> L.	Violaceae		langsporig viooltje	pensée des alpes	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		maarts viooltje	violette odorante	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Viola palustris</i> L.	Violaceae		moerasviooltje	violette des marais	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae		driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore des jardins, pensée tricolore	bovengrondse delen	parties aériennes	
<i>Viscum album</i> L.	Santalaceae		maretak	gui	tak, blad	branche, feuille	
<i>Virex agnus- castus</i> L.	Lamiaceae		monnikenpeper, kuisboom	gaillier, agneau- chaste	hele plant	plante entière	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 96 mg de fruit séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de gebruiken

Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae							1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à 1 g de rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans n'est pas autorisée.
--------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	---	---

* Het "totaal" gehalte aan anthranoiden dient berekend te worden via bepaling van de gehalten in de afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te worden. Bij mengsels van verschillende plantensoorten is het totaal gehalte te beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij enkelvoudig gebruik.

* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoides, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van ... tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,

Par le Roi:


Le Ministre de l'Agriculture,



David CLARINVAL

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,



Frank VANDEBROUCKE